

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



# GLORY 75 WG

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO, ESTROBILURINA  
MANCOZEB, AZOXYSTROBIN

**ATENCIÓN**  
**ANTÍDOTO: NO TIENE**

ESTE PRODUCTO PUEDE SER DAÑINO SI SE INGIERE Y PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,



## USO AGRONÓMICO

### MODO DE ACCIÓN Y MECANISMO:

El mancozeb es un fungicida ditiocarbamato con acción de contacto y protectora. Actúa sobre diferentes sitios de la célula del hongo ocurriendo una acción "multi sitio". El Azoxystrobin es un fungicida de la familia Estrobilurina, de acción sistémico-translaminar, se utiliza de forma preventiva, curativa, erradicante y anti-esporulante. El Glory 75 WG actúa sobre un amplio espectro de enfermedades fungosas.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

En aplicaciones terrestres se recomienda el uso de aspersora motorizada acondicionando las boquillas según el tipo de cultivo para asegurar una buena cobertura del follaje.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua; agregar la dosis recomendada del producto y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación agitando vigorosamente. Los utensilios usados como, dosificadores, cubetas, aspersores, durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados con el método del triple lavado, después de cada jornada de trabajo. Recuerde dar mantenimiento permanente al equipo de aplicación. El pH óptimo es de 7.



## RECOMENDACIONES DE USO: En El Salvador

CULTIVOS	ENFERMEDADES A CONTROLAR	DOSIS
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	1.5- 2.5 kg/ha (1.05-1.75 kg/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizon tardío <i>Phytophthora infestans</i>	2.0- 3.0 kg/ha (1.4-2.1 kg/mz)
Maíz <i>Zea mays</i>	Roya común <i>Puccinia sorghi</i>	3.0 kg/ha (2.1 kg/mz)
Mango <i>Mangifera indica</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum gloesporioides</i>	2.5- 3.0 kg/ha (1.75- 2.1 kg/mz)
Melón <i>Cucumis melo</i> Ayote <i>Cucurbita máxima</i> Zuchinni <i>Cucurbita pepo</i> Chayote <i>Cucurbita sp.</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	Mildiú de las cucurbitáceas <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.5- 2.5 kg/ha (1.05-1.75 kg/mz)
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum L.</i>	Roya naranja <i>Puccinia kuehnii</i>	1.5- 2.5 kg/ha (1.05-1.75 kg/mz)
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mancha angular <i>Phaeoisariopsis griseola</i>	1.5- 2.5 kg/ha (1.05-1.75 kg/mz)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Manchado del arroz <i>Helmithosporium spp.</i> <i>Pseudomonas grisea</i> <i>Cercospora sp.</i> <i>Curvularia sp.</i>  Podrición de la vaina <i>Saracladium oryzae</i>	2.0 kg/ha (1.4 kg/mz)     1.75 kg/ha (1.23 kg/mz)

### INTERVALO ENTRE APLICACIONES:

En tomate, papa, chile, berenjena, maíz, mango, melón, ayote, zuchinni, chayote, sandía y arroz 7 días. En frijol 10 a 15 días.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

En tomate, papa, chile y berenjena 5 días, maíz 40 días, mango 0 días. En melón, ayote, zuchinni, chayote y sandía 5 días. En frijol 7 días. En arroz 25 días.

### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda ingresar 12 horas después de la aplicación, en caso de necesitar ingresar antes, se debe usar el equipo de protección personal.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas en este panfleto.

### COMPATIBILIDAD:

No es compatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad si se desea mezclar el producto con otros plaguicidas.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Mantenga los herbicidas fuera del contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco, aireado alejado del calor y las llamas, alejado de los niños, personas discapacitadas y los animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar. El producto no es corrosivo ni explosivo.

NO ALMACENE ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN, CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Es tóxico si se inhala, puede ser irritante a la membrana mucosa y el tracto respiratorio superior. Puede causar irritación en piel y ojos. Puede ser peligroso si se ingiere.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**INGESTIÓN:** no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o Centro de Salud. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**CONTACTO CON LA PIEL:** se debe quitar la ropa contaminada, lavar la parte afectada con jabón y abundante agua y si la irritación persiste pedir ayuda médica.

**INHALACIÓN:** Lleve a la persona a un lugar fresco y ventilado, si no respira llame de inmediato a un médico.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Abra bien el ojo y lávelo con agua. Si la irritación persiste comuníquese con un médico

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No existe antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN**

INSTITUCIÓN	PAÍS	Nº TELÉFONO
Centro de Info. Toxicológica	Guatemala	(502) 251-3560
Karl Heusner, Memorial Hospital	Belice	(501) 231-1548
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Hospital Escuela	El Salvador	(503) 221-0966 ext 140 (504) 232-6213
Centro Nac. de Información Toxicológica	Honduras	(504) 232-6213
Centro Nac. Control de las Intoxicaciones	Nicaragua	(505) 2289-4700 ext 1294. Cel: 87550983.
Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos	Costa Rica	(506) 2223-1028
Hospital Dr. Luis E. Aybar	Panamá	(507) 269-2471
Hospital Dr. Francisco Moscoso	Rep. Dominicana	(809) 684-3478
	Rep. Dominicana	809) 681-2913

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



MANEJO DE ENVASES



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben permanecer en su envase original debidamente cerrado y etiquetado

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTÍA:**

Garantizamos el contenido de este producto siempre que se encuentre en su empaque original bien cerrado con su sello de garantía inalterado. No asumimos responsabilidades por posibles daños ocasionados por el mal uso de este producto. Solo garantizamos el contenido declarado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El usuario adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

**FORMULADO POR:**

**UPL LIMITED**

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (W), Mumbai-400052, India  
Tel 0091 02646-50336

**IMPORTADOR:**

**UPL Costa Rica S.A.**

Condominio Industrial Flexipark  
San Rafael de Alajuela  
Tel: (506) 2239-2080

PAÍS  
El Salvador

Nº DE REGISTRO  
AG2017081182