

FICHA TÉCNICA

Este documento es únicamente de carácter informativo y exclusivo para su publicación electrónica

NOMBRE COMERCIAL:	CONSENTO 45 SC
TIPO:	Fungicida
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada
GRUPO QUÍMICO:	Carbamate, Imidazole
INGREDIENTE ACTIVO:	Propamocarb, Fenamidone
NOMBRE QUÍMICO:	propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride, (S)-1-anilino-4-methyl-2-methylthio-4-phenylimidazolin-5-one
CONCENTRACIÓN (p/v):	45% (Equivalente a 450 g I.A./L)
MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:	CONSENTO [®] 45 SC es un fungicida combina dos modos de acción, el traslaminar y el sistémico, y con sus distintos mecanismos de acción: Fenamidone inhibe la respiración mitocondrial y Propamocarb HCL es un fungicida que afecta la síntesis de los fosfolípidos, ácidos grasos y por ende afecta la membrana del hongo. Consento 45 SC actúa eficazmente a nivel preventivo y curativo.

**CATEGORÍA
TOXICOLÓGICA**

:

**Categoría Toxicológica: 4
ATENCIÓN**

**“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Tomate Berenjena Chile	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Mancha foliar gris <i>Septoria spp.</i>	1,42 - 2,14 l/ha (1 - 1,5 l/mz)
Papa	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	2,14 - 2,8 l/ha (1,5 - 2 l/mz)
Melón Pepino Sandía Calavazas	Moho felpudo <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Sarna o roña de las cucurbitáceas <i>Cladosporium cucumerinum</i>	2 l/ha (1,4 l/mz)
Tabaco	Ojo de sapo <i>Cercospora nicotianae</i> Moho azul <i>Peronospora tabacina</i> Pata negra <i>Phytophthora palmivora</i>	2 - 2,5 l/ha (1,4 - 1.75 l/mz)
Repollo	Alternaria <i>Alternaria brassicae</i> Moho felpudo <i>Peronospora brassicae</i>	2 - 2,5 l/ha (1,4 - 1.75 l/mz)
Hule	Raya negra <i>Phytophthora sp.</i>	Aplicar 60 ml de Consento 45 SC por galón de agua directamente sobre el panel de pica con una brocha de 2 pulgadas.
Uva	Mancha roja <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> Antracnosis <i>Elsinoe ampelina</i> Mancha negra <i>Guignardia bidwellii</i> Moho felpudo <i>Plasmopara viticola</i>	2 - 2,5 l/ha (1,4 - 1.75 l/mz)
Cebolla	Moho felpudo <i>Peronospora destructor</i>	2 - 2,5 l/ha (1,4 - 1.75 l/mz)
Lechuga	Moho felpudo <i>Bremia lactucae</i>	2 - 2,5 l/ha (1,4 - 1.75 l/mz)
Cítricos	<i>Phytophthora spp.</i>	2 - 2,5 l/ha (1,4 - 1.75 l/mz)
Ornamentales	Moho felpudo <i>Peronospora sp.</i>	2 - 2,5 l/ha (1,4 - 1.75 l/mz)

INTERVALO DE APLICACIÓN: De 5 a 10 días

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Utilizar equipo de aspersión manual de espalda o motorizado. Verifique que el equipo utilizado esté en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Para aplicar este producto se recomienda utilizar boquillas de CONO.

Vierta la mitad de agua y agregue la dosis recomendada de CONSENTO 45 SC, agite la mezcla y complete con agua el resto, (200 a 400 l/ha (140 - 280 l/mz)). Mantenga el agitador funcionando durante las operaciones de llenar, mezclar y rociar. Asegúrese de contar con el equipo necesario para dosificar, mezclar y aplicar el producto.

FITOTOXICIDAD

CONSENTO 45 SC no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD

CONSENTO 45 SC, es compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo, antes de hacer la mezcla, realice previamente pruebas para comprobar compatibilidad. No se recomiendan mezclas con reguladores de crecimiento, con cobre o con fertilizantes foliares que contengan alta concentración de nitrógeno.