

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

ACARISTOP 50 SC

ACARICIDA - TETRAZINA
CLOFENTEZINE

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,19 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION,
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION: ACARISTOP 50 SC es un acaricida a base de clofentezina con acción de contacto, actúa sobre huevos y larvas recién nacidas, evitando desde el inicio daños a su cultivo con las consecuencias negativas. ACARISTOP 50 SC interrumpe eficazmente el ciclo biológico de las arañas (ácaros). El efecto residual de ACARISTOP 50 SC es prolongado.

EQUIPO DE APLICACION:

Para la aplicación de ACARISTOP 50 SC se recomienda el uso de equipos de aplicación terrestre, utilizando de 100 a 400 litros de agua por hectárea, utilice boquillas de abanico plano. Todo equipo de aplicación tiene que estar debidamente calibrado antes de usarse, con respecto a la velocidad, dosis y uniformidad de distribución. El producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Cerchiórese que el equipo de aplicación esté limpio y no contaminado, calcule cuidadosamente la cantidad de mezcla de aplicación, a fin de prevenir cualquier residuo en el tanque después de hacer los tratamientos. Llene a ¼ - ½ tanque de mezcla con agua limpia, empiece a agitar, añada la cantidad medida y calculada de producto y continúe agitando durante el mezclado y aplicación para mantener una solución de rocío uniforme. Lave el equipo inmediatamente después de usarlo. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas y guantes de hule, mascarilla, anteojos, dosificadores graduados y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO:

Uso autorizado en: Guatemala, Belice, Honduras y Costa Rica.

CULTIVO	MALEZA QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Arañitas rojas <i>Tetranychus urticae</i>	20-40 ml/100 litros de agua
Flores en general	Arañita <i>bimaculada</i> <i>Tetranychus neocaledonicus</i>	20-40 ml/100 litros de agua

EPOCA DE APLICACION: Cuando se observen las primeras arañas.

INTERVALO DE APLICACION: Cada 7-15 días según la presencia de la plaga.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado o 24 horas. O utilice el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: ACARISTOP 50 SC es compatible con varios fungicidas, insecticidas o acaricidas. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer este tipo de mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, forrajes. Transpórtese y almacéñese bajo llave en un lugar fresco, seco, bien ventilado y alejado del calor o fuego directo y de la luz. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. Almacene y transporte aparte de fertilizantes y herbicidas. No es corrosivo, explosivo, ni inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

No es peligroso. Ligeramente irritante para la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Lave la boca con agua. No induzca al vómito. No le dé a beber a la víctima. Mantenga a la víctima en reposo. Consulte a un médico.

POR INHALACION: Lleve a la víctima al aire libre. Mantenga al afectado abrigado y en reposo. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con mucha agua. Consulte a un oftalmólogo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	231-1548 y 231-1639
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica	2288-0417
HONDURAS	Secretaría de Agricultura y Ganadería, Sanidad Vegetal	232-6213
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	289-7150 y 289-3328
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	269-2741
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	684-8478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

ES TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfóreolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

AVENTIS CROPSCIENCE UK LIMITED
HAUXTON, CAMBRIDGE CB2 5HU,
INGLATERRA
TELEFONO: (001303) 892-3000
FAX: (001302) 892-3064

AVENTIS CROPSCIENCE COLOMBIA, S. A.
CARR 77a. N° 45-61
AVENIDA EL DORADO, SANTA FE,
BOGOTÁ, COLOMBIA
TELÉFONO: 425-4100, FAX: 410-3100

IMPORTADOR Y/O DISTRIBUIDOR:



DUWEST
Sociedad con DuPont

DUWEST GUATEMALA
Via 4, 6-8, Zona 4, Guatemala C.A.
Tel: (502) 2332-2111 al 15, Fax: (502) 2332-2150

DUWEST EL SALVADOR
Calle el Progreso y Boulevard Venezuela Colonia
Roma, Frente al Hospital de Antel
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2245-3388, Fax: (503) 2223-6234

DUWEST HONDURAS
Boulevard de Norte, Río Blanco, contiguo a El Colonial,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 551-5948 al 49, Fax: (504) 551-5098

DUWEST NICARAGUA
Plaza 3F Zos. Piso Modulo B-5
Km. 5 Carretera Norte
Managua, Nicaragua, C.A.
Tel: (505) 248-6502, Fax: (505) 248-6503

DUWEST COSTA RICA
Pavasa Zona Industrial 100 mts. Oeste de las
Oficinas Piza Hut Edificio Tisa Ser, Piso
San José, Costa Rica, C.A.
Tel: (506) 2260-7698, Fax: (506) 2266-7115

CRUZ DEL SUR DUWEST PANAMA
Via Interamericana frente a Durman Esquivel,
David, Chiriquí, Panamá
Tel: (507) 775-2568, Fax: (507) 774-0872

DUWEST REPUBLICA DOMINICANA
Ave. 27 de Febrero # 323, Ensanche Quisqueya,
Torre Elite Suite 205,
Santo Domingo, República Dominicana.
Tel/fax: (809) 563-9423

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	243-63	11-08-1999
BELICE	0306-1	03-03-2005
EL SALVADOR		
HONDURAS	370, F.186, T. III	13-08-2001
NICARAGUA		
COSTA RICA	2784	17-12-1994
PANAMA		
REP. DOMINICANA		