

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

Accent® 75 WG

HERBICIDA - SULFONILUREA
NICOSULFURON

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION: ACCENT® 75 WG, es un herbicida post-emergente, sistémico y selectivo, absorbido por el follaje. Penetra a la planta por raíces y follaje. Se trasloca por xilema y floema. Principal efecto adverso en la maleza es la inhibición del crecimiento e inhibe la síntesis de aminoácidos.

EQUIPO DE APLICACION:

ACCENT® 75 WG, puede aplicarse con equipos de aspersión terrestres y aéreos, utilizando boquillas de abanico plano indicadas para herbicidas que produzcan gotas finas y una excelente cobertura. En ambos casos el personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: Botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua. Verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Aplique cuando el tiempo esté calmado y sin brisa. Se aplica por vía terrestre, utilice hasta 400 l de caldo / ha. Este producto no afecta los equipos de aplicación.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Se diluye en agua antes de aplicarlo. La dosis a usar se adiciona al recipiente parcialmente lleno de agua, se agita con una paleta y se completa el volumen. Agregar un surfactante no iónico en una proporción de 0,25% (250 ml/100 l). Se agrega de último a la mezcla. Durante la preparación y aplicación, es necesario mantener la suspensión en constante agitación. Asegúrese de contar siempre con equipo auxiliar como cubetas, brochas, cepillos, dosificadores y otros que le sirvan de ayuda en la preparación y aplicación de **ACCENT® 75 WG**.



RECOMENDACIONES DE USO:

ACCENT® 75 WG, está recomendado para usarse en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Rep. Dominicana.

ACCENT® 75 WG, es un herbicida selectivo al cultivo del maíz **Zea mays** siendo post-emergente tanto a la maleza como al cultivo, tiene un buen control sobre las siguientes malezas:

MALEZAS DE HOJA ANCHA:	DOSIS g/Ha (g/mz)
Bledo Girasol Mostacilla Lengua de vaca Abrjo Verdolaga	Amaranthus spp. Helianthus spp. Brassica spp. Rumex crispus Tribulus terrestris Portulaca oleracea
GRAMINEAS:	
Zacate de agua Zacate pinto Zacate brillante Zacate pitillo Avena loca Guardarocio Plumilla Sorgo Zacate Johnson	Echinochloa crus-galli Echinochloa colonum Brachiaria extensa Lophochorax unisetus Avena fatua Digitaria sanguinalis Leptochloa spp. Sorghum vulgare Sorghum halepense

ACCENT® 75 WG debe ser aplicado post-emergente cuando la maleza se encuentre con 2 a 5 hojas o 10 centímetros de altura de la maleza.

COSTA RICA

MALEZAS DE HOJA ANCHA		
Clavo de agua Botoncillo Bledo Golondrina Lechosa Botoncillo Balsilla Batatilla Pega - Pega Buche de gallina Verdolaga Hierba de pollo Dormilona	Jussiaea spp. Caperonia palustris Amaranthus dubius Euphorbia hirta Euphorbia heterophylla Eclipta alba Corchorus orinicensis Ipomoea congesta Desmodium tortuosum Heteranthera reniformis Portulaca oleracea Commelina diffusa Mimosa pudica	Frijolillo Escobilla Escoba Verbena Morada Hierbamora Meloncillo Uchuba Añil Chispa Mortño negro Mortño blanco Friega platos

CULTIVOS QUE PROTEGE	DOSIS kg/ha	FORMA DE APLICACION
Maiz Zea mays	Se recomienda 52,5 gramos por hectárea (36 g por mz), a 67,5 gramos por hectárea (46 g por mz).	La dosis más baja para malezas de 5 a 10 cm y la más alta para malezas de 10 a 12 cm. Y la utilización de un surfactante no iónico en la dosis

INTERVALO DE APLICACION:

Una vez por ciclo del cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Esperar 30 días para cosechar.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Espera a que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

ACCENT® 75 WG, no es fitotóxico al maíz en las dosis recomendadas y de acuerdo a las instrucciones establecidas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD:

Aplique **ACCENT® 75 WG** en maíces que no hayan sido tratados con insecticidas al suelo o que hayan sido tratados con Clorpirifos, Carbofuran o Piretroides. No aplique **ACCENT® 75 WG** en maíces previamente tratados con insecticidas organofosforados sistémicos al suelo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene lejos de los niños. Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas.

Manténgalo en su empaque original cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de fertilizantes, fungicidas e insecticidas. No es inflamable ni oxidante.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Se presenta irritación en los ojos y la piel, con lagrimeo de las mucosas y ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.

POR INHALACION: Retire del área contaminada a la persona afectada y llévela a un lugar ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con agua limpia durante 15 minutos como mínimo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	231-1548 y 231-1639
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	2288-0417
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2316
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	289-7150 y 289-3328
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	269-2741
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	684-8478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS. NO CONTAMINE RIOS, LAGOS, Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material absorbente y los envases perforelos; en ambos casos entiérrelos a 40 cm de profundidad, lejos de fuentes de agua superficiales o subterráneas y casas de habitación.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de su aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso, el fabricante no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FABRICANTE Y FORMULADOR:



E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
CROP PROTECTION
Willmington, Delaware, 19898
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



DUWEST
Sociedad con DuPont

DUWEST GUATEMALA
Via 4, 6-65, Zona 4, Guatemala C.A.
Tel.: (502) 2332-2111 al 15, Fax: (502) 2332-2150

DUWEST EL SALVADOR
Calle el Progreso y Boulevard Venezuela Colonia Roma. Frente al Hospital de Antel
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2245-3388, Fax: (503) 2223-6234

DUWEST HONDURAS
Boulevard de Norte, Rio Blanco, contiguo a El Colonial,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 551-5948 al 49, Fax: (504) 551-5098

DUWEST NICARAGUA
Plaza 3F 2do. Piso Modulo B-5
Km. 5 Carretera Norte
Managua, Nicaragua, C.A.
Tel.: (505) 248-6502, Fax: (505) 248-6503

DUWEST COSTA RICA
Pavsa Zona Industrial 100mts. Oeste de las Oficinas Piza Hui Edificio Tisa Ser. Piso San Jose, Costa Rica, C.A.
Tel.: (506) 2290-7850, Fax: (506) 2290-7115

CRUZ DEL SUR DUWEST PANAMA
Via Interamericana frente a Durman Esquivel
David, Chiriquí, Panamá
Tel: (507) 775-2368, Fax: (507) 774-0872

DUWEST REPUBLICA DOMINICANA
Ave. 27 de Febrero # 329, Ensamble Quisqueya,
Torre Elite Suite 205,
Santo Domingo, República Dominicana.
Tel/fax: (809) 563-6423

PAIS

GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
REP. DOMINICANA

NUMERO DE REGISTRO

396-27
0297-2
AG.96-10-393
219.F.110.T.I
EI-184-6-94
4213
1834

FECHA DE REGISTRO

06-11-1997
15-09-2005
08-10-1999
20-03-1998
02-05-1994
19-06-1998
06-03-2006