

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

Advance® 61 WP

HERBICIDA - UREA, TRIAZINA
DIURON, HEXAZINONE

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”
“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION: ADVANCE® 61 WP, es un herbicida de uso agrícola, sistémico, residual, pre y postemergente e inhibidor de la fotosíntesis que es absorbido por las raíces y las hojas.

EQUIPO DE APLICACION:

ADVANCE® 61 WP, puede aplicarse con equipos de aspersión terrestres y aéreos. En ambos casos el personal que manipule este producto deberá usar el equipo de protección personal: Botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Aplique ADVANCE® 61 WP, sobre el suelo uniformemente. Use de 200 a 400 l/ha. Use boquillas del tipo TK3 al TK6.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Preparar una pre-mezcla vertiendo el herbicida en un pequeño recipiente que contenga agua; agite vigorosamente hasta obtener una solución acuosa uniforme y libre de grumos; posteriormente, agregue la "lechada" al tanque de la aspersora con el sistema de agitación trabajando, finalmente complete el volumen de agua al tanque de la aspersora. Mantenga la mezcla en constante agitación. Termine de llenar el tanque con agua. Utilice un surfactante no iónico al 0,25% (250 cc por 100 litros de agua) y agregarlo como último ingrediente de la mezcla. Asegúrese de contar siempre con equipo auxiliar como cubetas, brochas, cepillos, dosificadores y otros que le sirvan de ayuda en la preparación y aplicación de ADVANCE® 61 WP.



RECOMENDACIONES DE USO:

ADVANCE® 61 WP, está recomendado para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Rep. Dominicana.

ADVANCE® 61 WP, está recomendado para ser utilizado en el cultivo de caña de azúcar **Saccharum officinarum** como herbicida post-emergente temprano. Aplique ADVANCE® 61 WP, en caña de azúcar en siembras nuevas ó solas antes de que la maleza mida 10 cm de altura. En caso de existir en campo ciperáceas, se debe mezclar ADVANCE® 61 WP, con un herbicida específico para este tipo de malezas.

MALEZAS DE HOJA ANCHA		
Acacia Amargosa Calabacilla o Meloncillo Chilillo Cohombro, Calabacilla Dormilona Vergonzosa Escobilla o Malva Flor amarilla Grisol Hierba lechosa, Chontalpa Lechuguilla Lechuguilla Mostaza silvestre, Flor de nabo Queite cenizo Zacate de agua Tolache, Chamico Zanahoria silvestre	Agcilla molleina Ambrosia artemisiifolia Cucurbita spp. Cokozonum sp. Cucurbita foetidissima Mimosa pudica Sida spp. Melampodium divaricatum Hibiscus annuus Asclepias sp. Sida sp. Lactuca serriola Brassica campestris Chenopodium album Richardia spp. Datura stramonium Daucus carota	Azcitilla Bejuco Chayulillo, Acarino Chiriva silvestre Diente de león, Morraja Ecolillo Estafiate Geranio Golondrina o Lechosa Lante, Ullantén Lengua de vaca Malva peluda Queite, Bledo o Alegria Siempre viva Trelco Tomatillo silvestre, Toniche Zanzamora silvestre, capulinillo
		Bidens spp. Ipomoea spp. Sicyos angulata Cassia sativa Taraxacum officinale Cassia tora Ambrosia spp. Ecolillo Geranium carolinianum Euphorbia pulcherrima Hantsago spp. Rumex crispus Malva parviflora Amaranthus spp. Commelina erecta Cynla indica Solanum nigrum Ribes spp.
GRAMINEAS		
Alpistillo Digitaria, Zacate conejo Grana del norte, Camilote Pasto cenizo Zacate de agua Zacate carnalite Zacate oca de zorro Zacate johnson Zacate pangoda Zacate panicum, Zacate pará Zacate pinto, Anrocillo Camandora, Zacate peludo Zacate salado, Cola de zorro Zacate brillante	Phalaris minor Digitaria sanguinalis Cynchola repens Scaevola coccinea Echinochloa crus-galli Paspalum notatum Setaria spp. Sorghum halepense Digitaria spp. Panicum purpurascens Echinochloa colona Rottboellia cochinchinensis Ectocloa filiformis Brachiaria spp.	Cola de zorro, Zacate peludo Escobilla Pangolilla Tira de pelo, Matanza Zacate cañillo, Guachapote, Mozote Zacate cebadillo Zacate guinea o Privilegio Zacate negro Zacate para Zacate pata de gallo, Grana de Caballo Zacate pello Zacate rosado
		Setaria geniculata Cynchola spp. Digitaria horizontalis Scleria spp. Scaevola acchinatus Panicum spp. Panicum maximum Panicum fasciculatum Brachiaria mutica Eleusine indica Cynchola uncinata Agropyron repens

COSTA RICA

MALEZAS DE HOJA ANCHA		MALEZAS GRAMINEAS	
Bledo Pascua de monte Cabeza de pollo Bejuco Verdolaga Altamisa Cinco - Ballico Cenizo Flor amarilla Flor blanca Flor amarilla Frijolillo Sancocho	Amaranthus dubius Euphorbia spp. Eclipta alba Ipomoea spp. Portulaca oleracea Ambrosia artemisiifolia Lotium spp. Chenopodium ambrosioides Batimora recta Bidens pilosa Melampodium divaricatum Cassia spp. Boerhavia erecta	Limpia frascos Digitaria Arrocillo Avena silvestre Pasto loroquilla Pasto azul Pajilla Pangolilla Pata de gallina Plumilla Talluste Zacate guinea Zacate negro	Setaria geniculata Digitaria sanguinalis Echinochloa colona Avena fatua Paspalum conjugatum Poa annua Panicum fasciculatum Digitaria horizontalis Eleusine indica Leptochloa filiformis Digitaria insularis Panicum maximum Sporobolus poiretii

CULTIVOS QUE PROTEGE	DOSIS kg/ha (kg/mz)	FORMA DE APLICACION
Caña de azúcar Saccharum officinarum	preemergencia 1,1 - 1,23 (0,77 - 0,86) postemergencia 1,23 - 1,3 (0,86 - 0,91) postemergencia media 1,23 - 1,3 (0,86 - 0,91) postemergencia tardía 1,3 - 1,62 (0,91 - 1,134)	Puede usarse en forma preemergente o postemergente en mezcla de tanque con Velpar 75 WG para el control de amplia gama de hoja ancha y gramíneas.
Piña Ananas comosus	2,0-3,0 (1,4 - 2,1)	Antes de siembra. Post-siembra. Al final de la cosecha Aplicar hasta 12 kg/ha (8,4 kg/mz) por ciclo de cultivo.

DOSIS RECOMENDADA:

Dosis: 2,0 a 3,0 kg/ha (1,4 - 2,1 kg/mz), usar dosis más alta en lotes con una infestación alta de malezas o en suelos con altos contenidos de materia orgánica o arcilla.

EPOCA DE APLICACION:

ADVANCE® 61 WP, se debe aplicar en post-emergencia temprana a maleza, o sea cuando estas tienen de 2 a 4 hojas verdaderas. Aplique en caña de azúcar en siembras o socas antes de que la maleza mida 15 cm. o tenga de 2 - 4 hojas verdaderas. Post-emergente: Aplique en caña de azúcar en siembras o socas cuando la maleza esté presente y esta tenga una altura promedio de 20 cm. Agregar un surfactante no iónico al 2.5% (25 mL por litro de agua)

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

30 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Esperar como mínimo 24 horas después de la aspersión.

FITOTOXICIDAD:

ADVANCE® 61 WP, en las dosis recomendadas no ocasiona fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD:

ADVANCE® 61 WP, no es compatible con productos que tengan reacción alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

ADVANCE® 61 WP, debe conservarse en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. Al transportarlo hágalo alejado de productos alimenticios, animales, forraje y otros plaguicidas. La vida útil del producto puede verse disminuida si se almacena en condiciones de humedad excesiva.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Irritación o molestias en los ojos, lagrimeo y vista borrosa, molestias de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.
POR INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada y llévela a un lugar ventilado.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua limpia durante 15 minutos como mínimo.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 / 2232-0735 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	231-1548 y 231-1639
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	2525-5800 ext. 148 y 149
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2316
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2269-7150 y 2269-3328
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	523-4948
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar	684-9478 y 684-3672
	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO.

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS, Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

TOXICO PARA ABEJAS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de "triple lavado" y luego deben ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material. En caso de derrames, recójalos con aserrín o algún material absorbente y los empaques perforelos, en ambos casos entérrelos a 40 cm de profundidad, lejos de fuentes de agua, superficiales o subterráneas y casas de habitación.



EL USO DE LOS ENVASES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

DU PONT
DUPONT MEXICO, S.A. DE C.V.
358, F. 180, T. I
EL-022C-4-98
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
REP. DOMINICANA

IMPORTADO POR:

DUWEST
Sociedad con DuPont
DUWEST GUATEMALA
Via 4, 6-45, Zona 4, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2321-4747, Fax: (502) 2321-4750
DUWEST EL SALVADOR
Calle el Progreso y Boulevard Venezuela Colonia
Roma, Frente al Hospital de Anest
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2245-3388, Fax: (503) 2223-6234
DUWEST HONDURAS
Boulevard de Norte, Rio Blanco, contiguo a El Colonial,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 551-9348 al 42, Fax: (504) 551-5098
DUWEST NICARAGUA
Piazza 3F 2do. Piso Modulo B-5
Km. 5 Carretera Norte
Managua, Nicaragua, C.A.
Tel: (505) 2248-8502, Fax: (505) 2248-8503
DUWEST COSTA RICA
Pavasa Zona Industrial 100 mts. Oeste de las
Oficinas Plaza Hut Edificio Tisa Ser. Piso
San José, Costa Rica, C.A.
Tel.: (506) 2290-7850, Fax: (506) 2290-7115
CRUZ DEL SUR DUWEST PANAMA
Via Interamericana frente a Durman Esquivel,
David, Chiriquí, Panamá
Tel: (507) 775-2588, Fax: (507) 774-6872
DUWEST REPUBLICA DOMINICANA
Km 1 Autopista Presidente Dr. Joaquín Balaguer
Apartado Postal 5-2,
Santiago, República Dominicana.
Tel.: (809) 575-3137, Fax: (809) 576-9618

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	396-109	09-09-1998
BELICE		
EL SALVADOR	AG, 99-01-538	26-09-2005
HONDURAS	358, F. 180, T. I	27-06-2005
NICARAGUA	EL-022C-4-98	23-12-1998
COSTA RICA	5068	17-02-2004
PANAMA	1099g	05-09-2005
REP. DOMINICANA	2918	17-04-2008