

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

Agri-mycin* 16,5 WP

BACTERICIDA - ANTIBIOTICO, BACTERIOSTATICO
ESTREPTOMICINA, OXITETRACICLINA

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”
“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION:

Los ingredientes activos del producto actúan de manera sistemática siendo absorbidos vía foliar y por lo tanto son trasladados a las diferentes partes de las plantas vía floema.

EQUIPO DE APLICACION:

El producto una vez preparado se debe aplicar utilizando bomba de espalda. El equipo deberá calibrarse utilizando agua. El producto no tiene ningún efecto corrosivo sobre el equipo. Utilice boquilla tipo cono hueco. Para la aplicación se deben usar botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes y ropa protectora.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Pesar y disolver en agua la dosis recomendada en recipientes separados al tanque aspersor. Llenar el tanque aspersor hasta un tercio de su capacidad. Agregar la dosis del Agri-mycin* 16,5 WP, complete la capacidad del tanque con agua limpia y agite hasta obtener una mezcla homogénea. Se debe aplicar dirigido al follaje a todo el cultivo o a los focos de infección. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua.



RECOMENDACIONES DE USO:

La Agri-mycin* 16,5 WP está recomendado en los siguientes cultivos:
Cultivos:

- (1) Papa (**)...Solanum tuberosum
- (2) Ornamentales...Dracaena, Philodendron, Dieffenbachia, Wamkii, Aglaonemas
- (3) Pera...Pyrus communis
- (4) Manzana...Malus sylvestris

Para el control de las siguientes enfermedades:

Enfermedades:

- (1) Pierna negra...Erwinia atroseptica
- (2) Bacteriosis causadas por los géneros...Xanthomonas, Erwinia y Pseudomonas
- (3) Mancha bacterial...Erwinia amylovora
- (4) Quema bacterial...Erwinia amylovora

DOSIS:

En papa: Para el tratamiento de semilla de papa, se recomienda sumergir la semilla en una solución de 60-80 gramos de Agri-mycin* por cada 100 litros de agua, durante 2 a 5 minutos.

Para ornamentales: Preventiva: 240 gramos de producto formulado disueltos en 200 litros de agua. Aplicar a partir de la formación de las dos primeras hojas verdaderas. Se recomienda aplicar a intervalos de 5 a 7 días. Mínimo tres aplicaciones. **Curativa:** de 240 a 480 gramos de producto formulado disueltos en 200 litros de agua según la severidad de la infección y tipo de cultivo.

Para pera y manzana: Aplicar a razón de 120 gramos de producto formulado por cada 200 litros de agua y aplicar por primera vez cuando el cultivo presente un 10% de floración y continuar aplicando a intervalos de 5 días durante la floración, pero no aplicar dentro de los treinta días de cosecha.

EPOCA DE APLICACION:

Iniciar aplicaciones con la aparición de los primeros síntomas.

INTERVALO DE APLICACION:

Se recomienda aplicar a intervalos de 5 a 7 días durante el ciclo vegetativo del cultivo en caso de programas preventivos. Mínimo tres aplicaciones. En caso de aplicaciones curativas seguir las recomendaciones del profesional en ciencias agrícolas.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Siete días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Dos horas.

FITOTOXICIDAD:

En algunos casos se pueden presentar clorosis en los bordes de las hojas, que desaparecen de dos a tres días después sin daño aparente para la planta.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas excepto de tipo biológico, fertilizantes foliares, coadyuvantes (adherentes, humectantes, dispersantes) y fungicidas excepto aquellos que es solución presenten reacción alcalina. No se recomienda disolver con aguas duras.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No comer, beber o fumar durante el manejo, mezcla y aplicación de este producto. Use equipo de protección completo: protector de ojos, mascarilla, camisa de manga larga, pantalón, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse con regularidad. Evite el contacto directo del producto con las prendas de vestir, piel, ojos y boca. Evite respirar la llovizna de aspersión. Báñese con suficiente agua y jabón después de cada aplicación y vista ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. Lave la ropa, el protector de ojos, la mascarilla, los guantes y botas con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. La ropa se debe lavar aparte de la ropa de uso normal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forraje. Almacénalo bajo llave en un lugar fresco y seco alejado del calor o del fuego. Conserve y almacene el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. Almacene y transporte aparte de herbicidas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Puede producir irritación, náuseas y/o vómito. Puede causar alergias en la piel por contacto con el producto.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: De a beber jarabe de ipecacuana a una dosis de 30 ml para adultos y 15 ml para niños.

POR INHALACION: Retire la persona afectada del área contaminada a un área ventilada y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las prendas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto. Sigase tratamiento médico sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-400-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	231-1548 y 231-1639
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	2525-5800 ext. 148 y 149
HONDURAS	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2316
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2289-7150 y 2289-3328
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	523-4948
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	684-8478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.



TOXICO PARA ABEJAS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, deben ser eliminados en lugares lejanos y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

La compañía garantiza las características físicas y químicas de este producto que se describe en este empaque, así como los resultados a las dosis recomendadas. No se responsabiliza por el uso indebido ni por los resultados del producto cuando se aplica a dosis diferentes a las indicadas en la etiqueta. El comprador asume todo riesgo resultante del manejo y su uso de este producto.

FABRICANTE:

Pfizer, S.A. de C.V.
Km. 63 Carr. México
Toluca, México
*Marca Registrada de Pfizer Inc.
Nueva York, N.Y.

IMPORTADO POR:

PFIZER S.A. Y PFIZER ZONA FRANCA S.A.
PARQUE INDUSTRIAL ULTRAPARK, LA
AURORA HEREDIA COSTA RICA TEL.: (506)
293-2345 APARTADO 10202-100 SAN JOSÉ
COSTA RICA.

PAIS

GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
MÉXICO

NUMERO DE REGISTRO

80-03
3664
20, F. 10, T. II
PF-133B-497
3664
1021
RACO-MEZC.-1305-303-002-021

FECHA DE REGISTRO

24-07-2003

30-03-1995