

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

Avaunt® 30 WG

INSECTICIDA-OXADIAZINA
INDOXACARB

CUIDADO

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGERE Y/O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICOM:

MODO DE ACCION: AVAUNT® 30 WG, insecticida que actúa por ingestión y por contacto para el control de la mayoría de los Lepidópteros. Inhibe el flujo de iones de sodio hacia las células nerviosas, causando parálisis y posteriormente la muerte del insecto plaga afectado. La principal ruta de entrada al insecto es por ingestión del follaje tratado, y además es absorbido por la cutícula. El insecto afectado por indoxacarb cesa de alimentarse en 1-4 horas se paraliza y muere en 1-3 días.

EQUIPO DE APLICACION:

Calibre el equipo de aplicación lejos del pozo, ríos y fuentes de agua, utilizando únicamente agua limpia. Revise el equipo de aplicación regularmente. El personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador. **Tamaño de la gota:** La manera más efectiva de reducir el potencial de deriva o acarreo es la de aplicar con gotas más grandes (150- 200 micrones) que provean de una cobertura y control suficiente. **Volumen:** Utilice boquillas con alta tasa de flujo para aplicar el volumen más alto que sea práctico. Boquillas con mayores tasas de flujo, producen gotas más gruesas. **Presión:** Utilice las presiones menores recomendadas para la boquilla. A medida que aumenta la presión, disminuye el tamaño de la gota sin mejorar la penetración/coertura del follaje. **CUANDO SE REQUIERA DE MAYORES TASAS DE FLUJO, UTILICE UNA BOQUILLA DE MAYOR CAPACIDAD, NO AUMENTE LA PRESION.** **Tipo de boquilla:** Utilice boquillas que estén diseñadas para el tipo de aplicación en cuestión. Para la mayoría de los tipos de boquillas, a medida que el ángulo de aspersión es menor, mayor será el tamaño de la gota. Considere la utilización de boquillas de baja deriva. Como controlar el tamaño de la gota en aplicaciones aéreas: **Número de boquillas:** Utilice el mínimo de boquillas con la mayor tasa de flujo para obtener una cobertura uniforme. **La orientación de las boquillas:** De tal manera que la aspersión se emita hacia atrás, paralela al flujo del aire, producirá gotas más grandes que otras orientaciones. **Tipo de boquillas:** De flujo sólido (tales como las de disco y médula habiéndose quitado la placa de choque o "swirl plate") orientadas hacia atrás, producen gotas más grandes que otras boquillas.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Agítese antes de usar, hacer una premezcla de la dosis de AVAUNT® 30 WG, con agua en un envase aparte. Llense el tanque de aspersora a 1/2 de su capacidad con agua, y agregue la premezcla que hizo con la cantidad de AVAUNT® 30 WG que se indica en la sección de Recomendaciones de Uso Por Cultivo. Mezcle muy bien con un agitador mecánico (nunca con las manos, ni con agitadores de aire) termine de llenar el tanque con agua. No guarde la mezcla en el tanque de la aspersora de un día para otro. En aplicaciones aéreas utilice un mínimo de 60 L de agua por ha. AVAUNT® 30 WG es estable a pH entre 5-9.



RECOMENDACIONES DE USO:

AVAUNT® 30 WG, está recomendado en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Rep. Dominicana.

CULTIVOS:	PLAGAS A CONTROLAR:	DOSIS RECOMENDADAS:	RESTRICCIONES:
Brócoli Brassica oleracea var. <i>Capitata</i>	Palomilla dorso de diamante Plutella xylostella	Aplicar de 100 a 250 gramos de producto comercial por hectárea, (0,375 a 0,625 g /L).	No se debe aplicar más de 2 kg/ha de producto comercial por temporada.
Coliflor Brassica oleracea var. <i>Botrytis</i>	Gusano falso medidor Trichoplusia ni		
Col de Bruselas Brassica oleracea var. <i>Gemifera</i>	Palomilla importada de la col Pieris rapae Gusano soldado Spodoptera exigua Gusano heliotes Helicoverpa spp.	Agregue a la mezcla un surfactante no iónico.	Equivalente a 600 gramos de ingrediente activo por temporada.
Lechuga Lactuca sativa	Gusano soldado Spodoptera exigua Gusano falso medidor Trichoplusia ni		
Chile Capsicum annuum	Gusano del fruto Helicoverpa zea Gusano soldado Spodoptera exigua Gusano falso medidor Trichoplusia ni		
Maíz dulce Zea mays	Gusano soldado Spodoptera exigua Gusano del fruto Helicoverpa zea		
Tomate Lycopersicon esculentum	Gusano soldado Spodoptera exigua Gusano falso medidor Trichoplusia ni Gusano alfiler Keiferia lycopersicella		
Manzanas Pyrus malus Para Pyrus communis	Enrolladores de la hoja Argyrotaenia velutinana Picudos Conotrachelus spp. Chicharritas Typhlocyba pomaria Empoasca fabae Palomilla del manzano Cydia pomonella Gusano del manzano Grapholita prunivora		
Melón Cucumis melo	Gusano del melón Diaphania hyalinata	150 - 250 g/ha (105 - 175 g/mz) Dosis por volumen (g/l): 0.5-0.83	Aplicar con un intervalo de 5 a 7 días.

INTERVALO DE APLICACION:

Aplicarlo siempre que la plaga sobrepase el umbral económico, tomando en cuenta de no aplicar más de 600 gramos de ingrediente activo por temporada.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

3 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

No entre, o permita que otras personas entren en el área aplicada sin el equipo de protección adecuado, en un lapso de 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

AVAUNT® 30 WG no es fitotóxico a los cultivos agrícolas que se especifican en esta panfleto, siempre y cuando se sigan las instrucciones referentes a dosificación.

COMPATIBILIDAD:

AVAUNT® 30 WG, es compatible con la mayoría de los productos utilizados para protección de los cultivos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene lejos de niños. Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. El período de utilidad del producto puede verse disminuido si se mantiene en condiciones de almacenaje con humedad excesiva. No es corrosivo ni inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

El contacto con los ojos puede causar irritación, lagrimeo, dolor o visión borrosa. El contacto de la piel puede causar comezón, enrojecimiento e hinchazón. La inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias superiores acompañada de tos y malestar. La ingestión de grandes cantidades puede causar alteraciones en el conteo de glóbulos rojos y/o anemia. Puede causar náuseas, vómito, mareo.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Retire a la persona de la fuente de exposición. De a beber uno o dos vasos de agua e induzca el vómito, si la persona esta consciente, introduciendo un dedo en la garganta. **POR INHALACION:** Retire a la persona de la fuente de exposición y colóquela donde pueda respirar aire limpio. Si la persona respira con dificultad suministre oxígeno. **POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico si persiste la irritación. **POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lave con abundante agua y jabón. Llame al médico si persiste la irritación.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

Antidoto no tiene. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 14301-00-23632
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	2231-1548 y 2233-081
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	2525-5800 ext. 148 y 149
HONDURAS	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-3316
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2289-7150 y 2289-3328
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	523-4948
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aylar	684-3478
	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	681-2913

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

ES TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.



TOXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material. Los derrames deben ser recogidos con material absorbente (tierra, arena, aserrín) y colocados en envases especiales y deben ser llevados a los centros de acopio de estos productos para ser eliminados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o de las autoridades competentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de su aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso, el fabricante no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FORMULADOR:



DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) S.A.S.
89 rue de Wittelsheim,
68700 Cernay, Francia

IMPORTADOR:



DUWEST GUATEMALA
Via 4, 5-65, Zona 4, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2321-4747, Fax: (502) 2321-4750

DUWEST EL SALVADOR
Calle el Progreso y Boulevard Venezuela Colonia
Roma, Frente al Hospital de Antel
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2521-1200, Fax: (503) 2223-6234

DUWEST HONDURAS
Boulevard de Norte, Río Blanco, contiguo a El Colonial,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2551-5948 al 49, Fax: (504) 2551-5098

DUWEST NICARAGUA
Plaza 3F 2do. Piso Modulo B-5
Km. 5 Carretera Norte
Managua, Nicaragua, C.A.
Tel: (505) 2249-1675, Fax: (505) 2248-5603

DUWEST COSTA RICA
Pavas Zona Industrial 100 mts. Oeste de las
Oficinas Pizza Hut Edificio Tisa 3er. Piso
San José, Costa Rica, C.A.
Tel: (506) 2290-7850, Fax: (506) 2290-7115

CRUZ DEL SUR DUWEST PANAMA
Via Interamericana frente a Durman Esquivel,
David, Chiriquí, Panamá
Tel: (507) 775-2368, Fax: (507) 774-0872

DUWEST REPUBLICA DOMINICANA
Km 7 Autopista Joaquín Balaguer, Parque
Industrial Pisano, Nave No. 1
Santiago de Los Caballeros, República Dominicana.
Tel: (809) 241-9655, 575-1138, Fax: (809) 576-6618

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	396-659-2(1NNC)-B	21-12-2009
BELICE	0333-1	02-09-2010
EL SALVADOR	AG.2001-03-620	25-10-2010
HONDURAS	609,F,10,T,III	07-06-2001
COSTA RICA		
NICARAGUA	EI-369B-2-2009	15-06-2009
PANAMA	1386	19-12-2000
REP. DOMINICANA	3199	22-04-2009