

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Curzate® M 72 WP

FUNGICIDA - CIANOACETAMIDA, DITIOCARBAMATO
CYMOXANIL, MANCOZEB

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE AJEADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

El mancozeb y cimoxanil son fungicidas con acción de contacto, protector, curativo y erradicante. Actúa sobre la producción de energía, inhibiendo la formación de enzimas y afecta la germinación de esporas, crecimiento micelial y formación de conidióforos, ocurriendo una acción "multi-sitio".

EQUIPO DE APLICACIÓN:

CURZATE® M 72 WP, puede aplicarse con equipos de aspersión terrestres y aéreos. Para aplicaciones terrestres usar de 200 a 300 litros de caldo/ha. de acuerdo al cultivo y edad del mismo; en las aéreas usar de 25 a 30 litros/ha. En ambos casos el personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua, utilice boquillas de cono hueco. Verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Aplique cuando el tiempo esté calmado y sin brisa. Mantenga siempre a mano el equipo auxiliar que consiste en cubetas, dosificadores, paletas, brochas, cepillos y otros que le sean de utilidad en la preparación y aplicación del producto. Este producto no es corrosivo ni inflamable.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

La cantidad de agua debe ir acorde a el área de aplicación o el volumen de agua para preparar la mezcla, llene el tanque hasta la mitad, manteniendo una agitación constante, vierta la cantidad de producto necesario y termine de llenar el tanque de agua, agite bien la mezcla. Cada vez que va a llenar una aspersora recuerde agitar bien la mezcla. Puede agregar un dispersante-adherente como último ingrediente de la mezcla, a la dosis recomendada por el fabricante. Esta mezcla debe ser aplicada en aspersiones foliares en los cultivos recomendados.



RECOMENDACIONES DE USO:

CURZATE® M 72 WP, está recomendado para uso en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Rep. Dominicana.

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS	INTERVALO DE APLICACIÓN
TABACO Nicotiana tabacum	Moho azul Peronospora tabacina	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días dependiendo de la incidencia del hongo y la humedad.
PAPA Solanum tuberosum TOMATE Lycopersicon esculentum	Tizón tardío Phytophthora infestans	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días
Cucurbitáceas MELÓN Cucumis melo PEPINO Cucumis sativus SANDÍA Citrullus vulgaris	Mildiu lanoso Pseudoperonospora cubensis	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días
CEBOLLA Allium cepa	Mildiu lanoso Peronospora destructor	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días
LECHUGA Lactuca sativa	Mildiu lanoso Bremia lactucae	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días

Para el control del moho azul **Peronospora tabacina** se recomienda un programa preventivo con **CURZATE® M 72 WP** a la dosis de 250 gramos por 100 litros de agua. Utilice suficiente agua para obtener un completo cubrimiento de las plantas. Añada un agente humectante-adherente. Use como material de trasplante únicamente plantas libres de enfermedad. Inicie las aplicaciones en el campo entre 7 a 10 días después del trasplante o tan pronto como las plantas reinicien el crecimiento.

TABACO TAPADO: Aplique a intervalos de 5 días.

TABACO AL SOL: Aplique a intervalos de 3 a 5 días.

En condiciones severas de la enfermedad puede ser necesario acortar los intervalos de aplicación a 3 días tanto en el tabaco tapado como al sol.

DOSIS GENERAL: Aplique 40 gramos de producto por aspersora de 16 litros.

COSTA RICA

CULTIVO	ENFERMEDAD QUE CONTROLA	DOSIS
PAPA Solanum tuberosum	Tizón tardío Phytophthora infestans	DOSIS A UTILIZAR: Para el control de las enfermedades citadas se utiliza una dosis para controlar las enfermedades de 1,25 - 2,5 kg/ha (0,9 - 1,75 kg/mz).

INTERVALO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y repetir cada 3-7 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espera a que el rocío de la aplicación haya secado o en caso contrario utilizar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD:

CURZATE® M 72 WP, no es fitotóxico a las dosis e indicaciones establecidas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD:

CURZATE® M 72 WP, es compatible con insecticidas y fungicidas de uso común en los cultivos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños y bajo llave. No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable. La vida útil del producto puede verse disminuida si se almacena en condiciones de humedad excesiva.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Se presenta enrojecimiento de los ojos y alergias en la piel, irritación de las mucosas nasales, mareos y dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.
POR INHALACIÓN: Retire del área contaminada a la persona afectada y llévela a un lugar ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua limpia durante 15 minutos como mínimo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese la parte afectada con abundante agua y jabón.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Antídoto no tiene. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT	(502) 2230-0807 y 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	(501) 223-1639
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262 y (503) 2231-9201
HONDURAS	Hospital Escuela Universitaria	(504) 2232-2322 Ext. 420 y 478
NICARAGUA	Dirección de Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud	(505) 2289-4700, Ext. 1294
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2523-3600
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
REP. DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	(809) 681-7828, Ext. 2192

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**TÓXICO PARA PEÇES Y CRUSTÁCEOS.
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material. En caso de derrame, recójalo con una pala y deposítelo en un recipiente, entiérrole a una profundidad no menor de 40 cm. de profundidad, lejos de fuentes de agua superficiales o subterráneas, y casas de habitación. Perfore y entierre los envases vacíos, remanentes y desechos de igual forma a los derrames.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, el fabricante no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FORMULADOR:



DUPONT DE COLOMBIA, S.A.
Via 40 # 85-85, Barranquilla,
COLOMBIA



DUWEST
Sociedad con DuPont

DUWEST GUATEMALA
2a. Avenida, 10-45, zona 9, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2321-4747, Fax: (502) 2321-4750

DUWEST EL SALVADOR
Calle el Progreso y Boulevard Venezuela, Frente al Seguro Social, en la Colonia Roma
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2521-1200, Fax: (503) 2223-6234

DUWEST HONDURAS
Boulevard del Norte, Río Blanco, contiguo a El Colonial,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2551-5948 al 49, Fax: (504) 2551-5098

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DUWEST NICARAGUA
Km. 6,5 Carretera Norte, de las antiguas Of. de Siemens
200 mt. al sur Contiguo al Hospital Alemán Nicaragüense,
Ciudad de Managua, Nicaragua, C.A.
Tel.: (505) 2248-9030 y (505) 2240-1675

DUWEST COSTA RICA
Pavas, Zona Industrial a 100 mts. Oeste de las
Oficinas de Pizza Hut, Edificio Tisa 3er. Piso
San José, Costa Rica, C.A.
Tel.: (506) 2290-7850, Fax: (506) 2290-7115

CRUZ DEL SUR DISTRIBUIDOR PANAMÁ
Via Interamericana frente a Durman Esquivel,
David, Chiriquí, Panamá
Tel: (507) 775-2368, Fax: (507) 774-0872

DUWEST REPÚBLICA DOMINICANA
Km. 7, Autopista Joaquín Balaguer, Parque Industrial
Santiago Norte (Pisano), Nave No.1
Santiago de Los Caballeros, República Dominicana,
Tel.: (809) 241-9655, 575-3138, Fax: (809) 576-6616

PAÍS

GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REP. DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO

396-31
0112-23
396-31
35, F. 18, T. II
El-330-6-99
3582
1276e
3219

FECHA DE REGISTRO

10-09-1997
29-03-2012
19-02-2015
12-11-1996
30-08-1999
23-11-1994
30-12-1999
06-05-2009