

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

Equation® Contact 68,75 WG

FUNGICIDA-OXAZOLIDINEDIONA, DITIOCARBAMATO
FAMOXADONE, MANCOZEB

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE
INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”

“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION: Equation® Contact 68,75 WG es un fungicida formulado en gránulos dispersables para ser mezclado con agua, posee un amplio espectro de control, un nuevo modo de acción con actividad preventiva (pre-infección). Equation® Contact 68,75 WG contiene los ingredientes activos Famoxadone y Mancozeb. El famoxadone es un fungicida preventivo, su principal modo de acción consiste en la inhibición del transporte de electrones necesario para la fosforilación oxidativa en las mitocondrias de los hongos. Además Famoxadone es altamente activo contra la germinación de esporas y el crecimiento micelial. El Mancozeb es un fungicida preventivo con acción por contacto, multisitio que inhibe los procesos de respiración y generación de energía de los hongos.

EQUIPO DE APLICACION: Utilizar boquillas de cono hueco que produzcan gotas finas número 8002.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Disuelva completamente la cantidad a usar de Equation® Contact 68,75 WG en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo. Asegúrese de contar siempre con equipo auxiliar como cubetas, brochas, cepillos, dosificadores y otros que le sirvan de ayuda en la preparación y aplicación del producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Rep. Dominicana.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACION	PERIODO DE CARENCIA (**)
SOLANACEAS Papa, tomate, chile	Tizón tardío (Phytophthora infestans) Tizón temprano (Alternaria solani)	1.5-2.5 kg/ha 1.0-2.0 kg/mz 3-4 copas de 25 ml/bomba de mochila, 500 gramos/200 litros de agua	Cada 5 a 7 días. (*)	15 días antes de la cosecha
CUCURBITACEAS melón, pepino, sandía	Mildiu lanoso Pseudoperonospora cubensis			

COSTA RICA

PAPA	Tizón tardío (Phytophthora infestans) Tizón temprano (Alternaria solani)	1.5-2.5 Kg/ha 1.-2. kg/mz	Cada 5 a 7 días. (*)	15 días antes de la cosecha
------	---	------------------------------	-------------------------	-----------------------------

(*)El intervalo entre las aplicaciones depende de las condiciones climáticas, presión del patógeno, estado de desarrollo y variedad del cultivo.

INTERVALO DE APLICACION:

5-7 días

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

15 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Espera a que el rocío haya secado por lo menos 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

Equation® Contact 68,75 WG ha presentado alta seguridad sobre la papa, no causando síntomas de fitotoxicidad ni reducción en los rendimientos.

COMPATIBILIDAD:

Equation® Contact 68,75 WG, es compatible con fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares y coadyuvantes de uso frecuente en hortalizas. Utilícese la mezcla el mismo día de su preparación. En el caso de que se desconozca o dude de su compatibilidad con otro producto, haga previamente a su uso, una pequeña prueba en las mismas dosis de uso recomendadas en las etiquetas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene lejos de los niños. Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados lejos de alimentos, leños de forrajes, medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aporte de fertilizantes, fungicidas e insecticidas. No es inflamable ni oxidante. Debe evitarse que el producto formulado se humedezca ya que la humedad puede producir cambios que alteran su acción fungicida.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Equation® Contact 68,75 WG puede causar irritación de ojos. Puede irritar la piel con comezón, enrojecimiento y eritema. Puede irritar el tracto respiratorio superior con tos y malestar.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a la persona afectada 1 ó 2 vasos con agua. Induzca el vómito.

Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente.

POR INHALACIÓN: Lleve el paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación.

Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua limpia durante 15 minutos como mínimo. Si persiste la irritación ocular, consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto. El tratamiento debe ser sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS
GUATEMALA

NOMBRE DE LA INSTITUCION
Centro de Información y Asesoría Toxicológica

TELEFONO

2251-3560 y 2232-0735

1-801-00-29832

231-1548 y 231-1639

2525-5800 ext. 148 y 149

232-2322 y 232-2316

2289-7150 y 2289-3328

2223-1028

523-4948

684-8478 y 684-3672

681-2913 y 681-6922

BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
REPUBLICA DOMINICANA

Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital
Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael
Hospital Escuela
Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas
Centro Nacional de Intoxicaciones
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos
Hospital Dr. Luis E. Aybar
Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.

**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames, recójalos con aserrín o algún material absorbente, y los empaques perfórelos, en ambos casos entiérrelos a 40 cm. de profundidad lejos de fuentes de agua superficiales o subterráneas y casas de habitación. Los envases vacíos deben ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material. Desechos o remanentes del producto, no deben ser vaciados en fuentes de agua, deben ser eliminados en lugares lejanos y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones.

**EL USO DE LOS ENVASES Y EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA
LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL
AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, el fabricante no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:



DUPONT DE COLOMBIA, S.A.
Vía 40 #85-85,
Barranquilla, Colombia

IMPORTADO POR:



DUWEST
Sociedad con DuPont

DUWEST GUATEMALA
Vía 4, 5-65, Zona 4, Guatemala C.A.
Tel.: (502) 2321-4747, Fax: (502) 2321-4750

DUWEST EL SALVADOR
Calle el Progreso y Boulevard Venezuela Colonia
Roma, Frente al Hospital de Antel
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2245-3388, Fax: (503) 2223-6234

DUWEST HONDURAS
Boulevard de Norte, Río Blanco, contiguo a El Colonial,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 551-4948 al 49, Fax: (504) 551-5098

DUWEST NICARAGUA
Plaza 3F 2do. Piso Modulo B-5
Km. 5 Carretera Norte
Managua, Nicaragua, C.A.
Tel.: (505) 2248-6502, Fax: (505) 2248-6503

DUWEST COSTA RICA
Pavos Zona Industrial 100 mts. Oeste de las
Oficinas Pizza Hut Edificio Tisa 3er. Piso
San José, Costa Rica, C.A.
Tel: (506) 2290-7850, Fax: (506) 2290-7115

CRUZ DEL SUR DUWEST PANAMA
Vía Interamericana frente a Durman Esquivel,
David, Chiriquí, Panamá
Tel: (507) 775-2368, Fax: (507) 774-0872

DUWEST REPUBLICA DOMINICANA
Km 1 Autopista Presidente Dr. Joaquín Balaguer
Apartado Postal 3-2,
Santiago, República Dominicana.
Tel: (809) 875-3137, Fax: (809) 876-6618

PAIS
GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
REP. DOMINICANA

NUMERO DE
REGISTRO
396-119
AG.2000-11-606
280.F.140.T.II
EI-375-2001
4662
1344
3259

FECHA DE
REGISTRO
31-05-2000
23-11-2000
05-09-2000
15-06-2001
27-04-2001
17-07-2000
02-07-2009

MXVOBO-072710
DW-20471(270710)