

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Folpan 80 WG

FUNGICIDA-FTALIMIDA
FOLPET

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: El folpet es un fungicida con acción protectora y es inhibidor del proceso de respiración.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Antes de aplicar, asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. Utilice boquillas de cono hueco y un volumen de caldo de hasta 400 litros. El Folpet es ligeramente corrosivo a los metales.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de mezcla a la mitad de su capacidad, agregue la dosis de **Folpan 80 WG**, agite y termine de llegar con agua. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto. Lave el tanque de mezcla y el equipo de aplicación después de ser utilizado. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: EL SALVADOR, HONDURAS Y COSTA RICA.

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Apio <u>Apium graveolens</u> Sandía <u>Citrullus lanatus</u> Cebolla <u>Allium cepa</u> Melón <u>Cucumis melo</u>	Tizón foliar <u>Phytophthora infestans</u> Tizón foliar <u>Phytophthora capsici</u> Mancha púrpura <u>Alternaria porri</u> Antracnosis <u>Colletotrichum spp</u> Mancha de la hoja <u>Stemphylium sp</u>	125-160 gramos/100 litros de agua/ha Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, a intervalos de 15 a 22 días. Aplique otros fungicidas específicos en los periodos intermedios como benomil, mancozeb.
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum phomoides</u> Tizón tardío <u>Phytophthora infestans</u> Viruela <u>Septoria sp</u>	160 gramos/100 litros de agua/ha Aplique al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 6-10 días.
Fresa <u>Fragaria sp</u>	Mildió <u>Peronospora destructor</u> Mildió veloso <u>Pseudoperonospora cubensis</u> Mildió polvoso <u>Fusarium oxysporium</u> Pudrición del fruto <u>Botrytis cinerea</u>	125 gramos/200 litros de agua/ha
Helecho Hoja de Cuero <u>Rhumora adiantiformis</u>	Mildió <u>Peronospora destructor</u> Mildió veloso <u>Pseudoperonospora cubensis</u> Mildió polvoso <u>Fusarium oxysporium</u>	125 gramos/100 litros de agua/ha

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplique al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplique de 8 a 15 días de intervalo.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: 5-10 días para todos los cultivos

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas, o utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con bases fuertes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene lejos de los niños y casas de habitación. Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. No es inflamable ni explosivo. Ligeramente corrosivo a los metales.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irrita los ojos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Posibles efectos cancerígenos. La exposición repetida puede provocar dermatitis de contacto. Enrojecimiento, lagrimeo.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lave la boca con abundante agua. No administre nada oralmente a una persona inconsciente. Consulte a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. Mantenga al afectado abrigado y en reposo. Si no hay respiración, realice la respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, dé oxígeno. Llame a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con mucha agua. Si el dolor persiste, consulte a un oftalmólogo.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria. En caso de ingestión, hacer un lavado de estómago y administrar carbono activado.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	2251-3560/2232-0735
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Hospital Nacional Rosales	El Salvador	2231-9262
Hospital Dr. Luis Aybar	República Dominicana	684-3672
Hospital Dr. Moscoso Puello	República Dominicana	681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y REMANENTES:**

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR:

**ADAMA MAKHTESHIM, LTD.
P. O. BOX 60, BEER-SHEVA 8410001, ISRAEL
TELÉFONO: 972 (8) 629-6619
FAX: 972 (8) 629-6019**

**IMPORTADO POR:
DISTRIBUIDO POR:**

PAÍS	NÚMERO REGISTRO	FECHA REGISTRO
GUATEMALA	898-31	30-10-12
EL SALVADOR	3779	13-09-12
COSTA RICA	3779	06-11-95
REP.DOMINICANA	3391	30-11-09