

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

MTD® 60 SL

INSECTICIDA, ACARICIDA - ORGANOFOSFORADO
METHAMIDOPHOS



TOXICO

ANTIDOTO: SULFATO DE ATROPINA
DENSIDAD: 1,25 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”
“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION: MTD® 60 SL, es un insecticida, acaricida, de contacto, ingestión y estomacal con acción sistémica residual.

EQUIPO DE APLICACION: MTD® 60 SL, se puede aplicar con equipos de aspersión terrestres, utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. El personal que manipule este producto deberá utilizar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. El ingrediente activo de MTD® 60 SL es absorbido por las raíces muy rápidamente, gracias a su buena solubilidad en agua.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de la aspersora con agua hasta la mitad, agregar la dosis correcta de MTD® 60 SL, agite y complete el volumen de agua. Agite nuevamente hasta que se homogenice la mezcla. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como brochas, cepillos, dosificadores para líquidos, cubetas graduadas, paletas de agitación y otros que le sean de utilidad en la preparación y aplicación del producto. Después de asperjar, lave el equipo de aplicación con agua limpia y jabón.



RECOMENDACIONES DE USO: PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN LOS CULTIVOS RECOMENDADOS EN CADA PAIS.

GUATEMALA		
CULTIVO	PLAGA	DOSIS
ALGODON <i>Gossypium hirsutum</i>	Bellotero <i>Heliothis zea</i> Falso medidor <i>Trichoplusia nii</i> <i>Pseudoplusia includens</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Minador de la hoja <i>Bucculatrix thurberiella</i> Gusano medidor <i>Alabama argillacea</i> Pulgones <i>Aphis gossypii</i>	1,00 - 1,50 l/ha (0,7 - 1,0 l/mz) en 200 a 400 litros de agua
TOMATE Y CHILE <i>Lycopersicon esculentum</i>	Falso medidor <i>Pseudoplusia includens</i> Gusano medidor <i>Mocis spp.</i> Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Gusano de la fruta <i>Heliothis spp.</i> Pulgones <i>Aphis spp.</i>	
TABACO <i>Nicotiana tabacum</i>	Gusano de la yema del tabaco <i>Heliothis virescens</i>	
SANDIA <i>Citrullus vulgaris</i> MELÓN <i>Cucumis melo</i> BROCOLI <i>Brassica oleracea</i> var. capitata LECHUGA <i>Lactuca sativa</i> CEBOLLA <i>Allium cepa</i> PUERRO <i>Allium porrum</i> ZANAHORIA <i>Daucus carota</i> PAPA <i>Solanum tuberosum</i> MAIZ <i>Zea mays</i> FRIJOL <i>Phaseolus vulgaris</i> REPOLLO <i>Brassica oleracea</i> var. capitata AJO <i>Allium sativum</i> HABA <i>Vicia faba</i> AJONJOLÍ <i>Sesam indicum</i>	Pulgones <i>Myzus persicae</i> Gusano cornudo <i>Manduca sexta</i> Gusano del repollo <i>Pieris brassicae</i> Gusano medidor <i>Mocis repanda</i> Gusano peludo <i>Estigmene acrea</i> Lorito verde <i>Empoasca fabae</i> Palomilla de la col <i>Plutella xylostella</i>	
FLORES	Gusano de la flor <i>Heliothis spp.</i> Pulgones <i>Myzus persicae</i> Acaros <i>Tetranychus spp.</i>	

EL SALVADOR		
CULTIVO	PLAGA	DOSIS
PEPINO <i>Cucumis sativus</i> MAIZ <i>Zea mays</i> FRIJOL <i>Phaseolus vulgaris</i> REPOLLO <i>Brassica oleracea</i> var. capitata BROCOLLI <i>Brassica oleracea</i> var. italica LECHUGA <i>Lactuca sativa</i> AJO <i>Allium sativum</i> CAÑA DE AZUCAR <i>Saccharum officinarum</i> MELON <i>Cucumis melo</i> SANDIA <i>Cucumis vulgaris</i>	Pulgones <i>Myzus persicae</i> Gusano cornudo <i>Manduca sexta</i> Gusano del repollo <i>Pieris brassicae</i> Gusano medidor <i>Mocis repanda</i> Gusano peludo <i>Estigmene acrea</i> Lorito verde <i>Empoasca fabae</i> Palomilla de la col <i>Plutella xylostella</i> Cigarrita <i>Empoasca spp.</i> Gusano Soldado <i>Spodoptera sp.</i>	0,5 - 1,50 l/ha (0,35 - 1,0 l/mz) en 300 a 600 litros de agua

* Se prohíbe su uso en Jardinería.

HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
ALGODON <i>Gossypium hirsutum</i>	Bellotero <i>Heliothis zea</i> Falso medidor <i>Trichoplusia nii</i> <i>Pseudoplusia includens</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Minador de la hoja <i>Bucculatrix thurberiella</i> Gusano medidor <i>Alabama argillacea</i> Pulgones <i>Aphis gossypii</i>	1,00 - 1,50 l/ha (0,7 - 1,0 l/mz) en 200 a 400 litros de agua
TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i>	Falso medidor <i>Pseudoplusia includens</i> Gusano medidor <i>Mocis spp.</i> Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Gusano de la fruta <i>Heliothis spp.</i> Pulgones <i>Aphis spp.</i>	
TABACO <i>Nicotiana tabacum</i>	Gusano de la yema del tabaco <i>Heliothis virescens</i> Pulgones <i>Myzus persicae</i> Gusano cornudo <i>Manduca sexta</i>	

HORTALIZAS Y VEGETALES	Gusano del repollo <i>Pieris brassicae</i> Gusano medidor <i>Mocis repanda</i> Gusano peludo <i>Estigmene acrea</i> Lorito verde <i>Empoasca fabae</i> Palomilla de la col <i>Plutella maculipennis</i>	1,00 - 1,50 l/ha (0,7 - 1,0 l/mz) en 200 a 400 litros de agua
FLORES	Gusano de la flor <i>Heliothis spp.</i> Pulgones <i>Myzus persicae</i> Acaros <i>Tetranychus spp.</i>	

INTERVALO DE APLICACION: Se debe repetir la aplicación cuando el nivel de infestación alcance el punto crítico.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: Esperar de 14 a 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Se puede ingresar a la plantación 48 horas después de la aplicación. En áreas tratadas con MTD® 60 SL, el propietario del cultivo, deberá colocar un rótulo visible que diga: "CULTIVO TRATADO CON PLAGUICIDAS, PROHIBIDA LA ENTRADA".

FITOTOXICIDAD: MTD® 60 SL, no es fitotóxico al seguir las recomendaciones dadas.

COMPATIBILIDAD: MTD® 60 SL, es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados, pero siempre es conveniente hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicarlo con otro producto. No es compatible con sustancias alcalinas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: MTD® 60 SL, debe mantenerse en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado, a una temperatura no superior a 35°C. Almacénalo en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. Transportélo y almacénalo alejado de productos alimenticios, animales, forraje, medicamentos y otros plaguicidas. Verificar que la aplicación del producto sea realizada por personas previamente capacitadas y con el equipo de protección personal recomendado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



SINTOMAS DE INTOXICACION: Dolor de cabeza, náuseas, salivación, lagrimeo, visión borrosa, dolor de pecho, vértigos, debilidad, falta de coordinación, espasmos musculares, calambres abdominales, diarrea, sudoración, confusión. En casos severos: inconsciencia, pérdida del conocimiento y convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Provoque el vómito mediante la toma de un vaso de agua con sal e introduciendo el dedo en la garganta.

POR INHALACION: Retire del área contaminada a la persona afectada y llévela a un lugar ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con agua limpia durante 15 minutos como mínimo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

**NUCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: Antidoto: Sulfato de Atropina por vía intravenosa, repitiendo hasta que la atropinización se complete. Continuar con el tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-00-28832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	231-1548 y 231-1639
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	2525-5800 ext. 148 y 149
HONDURAS	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2316
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2289-7150 y 2289-3326
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	523-4948
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puerto	684-8478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA EL GANADO.

**TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**



TOXICO PARA ABEJAS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, deben ser eliminados en lugares lejanos y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES Y EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, el formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FORMULADOR:



WESTRADE GUATEMALA, S.A.

Aldea La Verde, Tecún Umán,
San Marcos, Guatemala C. A.
Tels: (502) 2420-5400 Fax: (502) 2420-5450

DISTRIBUIDO POR:



DUWEST
Sociedad con DuPont

DUWEST GUATEMALA
Via 4, 6-65, Zona 4, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2321-4747; Fax: (502) 2321-4750

DUWEST EL SALVADOR
Calle el Progreso y Boulevard Venezuela Colonia Roma, Frente al Hospital de Antel San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2245-3388; Fax: (503) 2223-6234

DUWEST HONDURAS
Boulevard de Norte, Río Blanco, contiguo a El Colonial, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2551-5948 al 49; Fax: (504) 2551-5098

DUWEST NICARAGUA
Plaza 3ª 2da, Río Múltiplo 6-5 Managua, Nicaragua, C.A.
Tel.: (505) 2248-6502; Fax: (505) 2248-6503

DUWEST COSTA RICA
Pivates Zona Industrial 100 mts. Oeste de las Oficinas Pizsa Hut Edificio Tisa 3er. Piso San José, Costa Rica, C.A.
Tel.: (506) 2290-7850; Fax: (506) 2290-7115

CRUZ DEL SUR DUWEST PANAMA
Via Interamericana Frente a Durman Esquivel, David, Chiriquí, Panamá
Tel: (507) 775-2368; Fax: (507) 774-0872

DUWEST REPUBLICA DOMINICANA
Km 1 Autopista Presidente Dr. Joaquín Balaguer Apartado Postal 9-2 Santiago, República Dominicana.
Tel.: (809) 575-3137; Fax: (809) 576-6618

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	381-1	06-03-2002
EL SALVADOR	AG.97-10-466	16-10-1997
HONDURAS	88.F.44.T.III	06-12-1994
NICARAGUA	WT-011W-2-92	08-04-1998
COSTA RICA	2864	17-07-1995
PANAMA	1376	15-11-2000
REP. DOMINICANA	1772	15-01-1998