

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

MERPAN® 50 WP

FUNGICIDA- FTALIMINA
CAPTAN

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICION.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”
“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONOMICICO:

MODO DE ACCION: MERPAN® 50 WP es un fungicida orgánico de amplio espectro fungoso que actúa por contacto con acción protestante. Puede utilizarse en el control de enfermedades fungosas de la raíz y el follaje.

EQUIPO DE APLICACION:

Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de usar MERPAN® 50 WP, calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando la dosis correcta. MERPAN® 50 WP puede ser aplicado con boquillas de cono hueco o sólido y equipos de fumigación aéreo o terrestre.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa de MERPAN® 50 WP que va a utilizar y mézclelo; posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza mezclas con MERPAN® 50 WP con otros pesticidas haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la mezcla. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la aspersora, debe de utilizar un tazón medidor y una balanza. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación, báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.



RECOMENDACIONES DE USO:

Los siguientes cultivos listados son los aprobados para el uso de MERPAN® 50 WP en Guatemala.

Cultivo	Enfermedad	Dosis por 100 l de agua
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solana</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Antracnosis <i>Colletotrichum phomoides</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Septoriois <i>Septoria lycopersici</i>	
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrus vulgaris</i>	Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Atracnosis <i>Colletotrichum orbiculare</i> Roña <i>Cladosporium cucumerium</i> Mildiu <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu veloso <i>Peronospora destructor</i> Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	
Maní <i>Arachis hipogaea</i>	Mal del talluelo <i>Rhizoctonia solana</i> Pudrición de la raíz <i>Sclerotium rolfsii</i>	0,24 a 0,92
Papaya <i>Carica papaya</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i>	
Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var.	Mancha de la hoja <i>Alternaria brassicae</i>	
Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Tizón temprano <i>Alternaria sonchi</i> Mancha de la hoja <i>Phomopsis spp.</i> Mal del talluelo <i>Phythium spp.</i>	
Manzana <i>Malus spp.</i>	Roña <i>Venturia inaequalis</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Mancha grasosa <i>Mycosphaerella citri</i> Atracnosis <i>Glomerella cingulata</i>	
Mango <i>Mangifera indica</i>	Atracnosis <i>Glomerella cingulata</i> Mancha de la hoja <i>Cercospora mangiferae</i>	
Chile <i>Capsicum Nahum</i>	Cercospora <i>Cercospora spp.</i> Antacnosis <i>Colletotrichum capsici</i>	
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	

INTERVALO DE APLICACION: Empezar las aplicaciones con los primeros indicios de daño y mantener una frecuencia de aplicación de cada 14 días.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

No tiene restricción ya que también tiene uso en postcosecha y tratamiento de semillas.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Las áreas tratadas con MERPAN® 50 WP pueden ser inspeccionadas 24 horas después de efectuada la aplicación. Si va en mezcla con otro agroquímico ver en el panfleto la restricción del mismo.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en las dosis recomendadas siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD:

MERPAN® 50 WP, es compatible con la mayoría de los plaguicidas existentes en el mercado, se recomienda realizar una premezcla en agua con los productos a utilizar. No debe mezclarse con soluciones alcalinas fuertes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

MERPAN® 50 WP, debe ser almacenado en lugares frescos y bien ventilados en su envase original, sellado y debidamente etiquetado. No transportar ni almacenar cerca de alimentos de consumo humano ni animal.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

La inhalación prolongada de los vapores puede causar irritación en el tracto respiratorio y efectos en el sistema nervioso central, resultando dolor de cabeza, disnea y confusión. Por ingestión puede causar náusea, dolor abdominal, dificultad respiratoria o diarrea. Irritación en la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Induzca al vómito. Lave la boca con agua. Si la respiración se dificulta, aplique respiración artificial, si es necesario también oxígeno. Consulte a un médico.
POR INHALACION: Remueva a la víctima al aire fresco. Si se dificulta la respiración, aplique respiración artificial, si es necesario también oxígeno. Consulte a un médico en caso se presenten complicaciones.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Si el dolor persiste, consulte a un oftalmólogo.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitese la ropa contaminada y lávese la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No hay antídoto específico. Hacer lavado gástrico, administrar fluidos en abundancia y proseguir con tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	231-1548 y 231-1639
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica	2288-0417
HONDURAS	Secretaría de Agricultura y Ganadería. Sanidad Vegetal	232-6213
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	289-7150 y 289-3328
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	269-2741
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	684-8478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS O ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material. Destruya el empaque y entierre a una profundidad adecuada, alejado de fuentes de agua y casa de habitación. En caso de derrames, utilice algún material absorbente como aserrín y recoja con una pala, entierre en un agujero lejos de fuentes de agua, casa de habitación y áreas de pastoreo.



EL USO DE LOS ENVASES Y EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, el formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FORMULADOR:



MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O. BOX 60 BEER-SHEBA 84 100
ISRAEL

DISTRIBUIDO POR:



PAIS
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
REP. DOMINICANA

NUMERO DE REGISTRO
243-14
264, F. 132, T.II

FECHA DE REGISTRO
30-08-2003
24-03-2000