

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

# MIREX-S® 0.3 GB

ZOMPOPICIDA - ORGANOFLUORINA  
SULFLURAMID

## PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O  
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”  
“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,  
ANIMALES DOMESTICOS Y MEDICAMENTOS”



### USO AGRONOMICO:

**MODO DE ACCION:** Por ingestión. **MIREX-S® 0,3 GB**, al ser llevado a la colonia,  
contamina el alimento provocando la muerte de los zompopos.

### EQUIPO DE APLICACION:

**MIREX-S® 0,3 GB**, se aplica directamente del envase a lo largo de los caminos de los  
zompopos. El personal que manipule este producto, deberá usar equipo de protección  
consistente en botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule y aplicador.



### FORMA DE APLICACIÓN.

**MIREX-S® 0,3 GB**, no debe colocarse dentro de las troneras, aplíquelo directamente  
en el cultivo o sobre el camino de los zompopos, ya que debe ser transportado por  
los zompopos. **MIREX-S® 0,3 GB**, se recomienda aplicarlo al atardecer cuando el  
transporte de los cebos por los zompopos podrá ser efectuado, incluso durante el  
período nocturno sin interrupción. Si se usan porta-cebos, se deben distribuir a lo largo  
de los caminos. Los zompopos romperán los porta-cebos y acarrearán el cebo. Los  
porta-cebos no deben usarse en pasturas.



### RECOMENDACIONES DE USO:

**MIREX-S® 0,3 GB**, está recomendado para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras,  
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

La acción de **MIREX-S® 0,3 GB**, es lenta pero segura, demora unos días en controlar  
la colonia, ya que por ser un cebo granulado tiene cierta resistencia a la humedad, pero  
justamente por tal motivo no es rechazado por los zompopos. No aplicar el producto  
en días lluviosos o con posibilidad de lluvia a fin de evitar que los cebos se mojen. No  
se aplique sobre suelos húmedos.

PLAGA	DOSIS
Zompopos <b>Atta spp.</b>	Aplicar 15 a 30 gramos por agujero de tronera.
Zompopos <b>Acromymex spp.</b>	6-50 gramos por tronera según tamaño del mismo.

### INTERVALO DE APLICACION:

Normalmente una única aplicación de **MIREX-S® 0,3 GB**, es suficiente para el control  
desde que es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso. Si los zompopos persisten  
puede hacerse una segunda aplicación entre 60 a 90 días después de la primera  
aplicación.

**INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:**  
El **MIREX-S® 0,3 GB**, no se aplica directamente a los cultivos.

### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Debido a la forma de aplicación (localizada) y tipo de formulación (cebo granulado),  
el reingreso de personas en las áreas tratadas puede ser efectuado inmediatamente  
después del transporte de los cebos por los zompopos hacia el interior de la tronera.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico porque su aplicación, generalmente, no se hace sobre las plantas.

### COMPATIBILIDAD:

Por ser un cebo granulado nunca se aplica o mezcla con otros plaguicidas.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

**MIREX-S® 0,3 GB**, debe conservarse en su envase original, debidamente cerrado y  
etiquetado en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave. Al transportarlo,  
manténgalo alejado de productos alimenticios, animales, forrajes y otros plaguicidas.  
La utilidad del producto puede verse disminuida si se almacena en condiciones de  
humedad excesiva.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y  
APLICACION DE ESTE PRODUCTO.  
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**



### SINTOMAS DE INTOXICACION:

Puede ocasionar pérdida de apetito, cansancio y diarrea.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTION:** provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua limpia durante 15 minutos como  
mínimo.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** lávese la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**POR INHALACION:** por la naturaleza del producto no aplica ninguna recomendación.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS  
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

### ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No existe antídoto específico. Por lo tanto, el tratamiento debe ser sintomático.

### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	231-1548 y 231-1639
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica	2288-0417
HONDURAS	Secretaría de Agricultura y Ganadería . Sanidad Vegetal	232-6213
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	289-7150 y 289-3328
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	269-2741
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puella	684-8478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

### MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

#### TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON  
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**



#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES

Los envases vacíos deben ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles  
para recibir este tipo de material. Desechos y remanentes del producto, no deben ser  
vaciados en fuentes de agua, deben eliminarse en lugares lejanos y de preferencia  
dentro de agujeros especiales.

**EL USO DE LOS ENVASES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON  
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### GARANTIA:

El fabricante garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición  
química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y  
otros factores relacionados con su uso, el fabricante no se responsabiliza de los  
resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

### FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

### DISTRIBUIDO POR:

**ATTA-KILL**

ATTA-KILL INDUSTRIA  
Av. Vieira de Carvahlo, 40 - 4a, andar  
SAO PAULO - SP - BRASIL  
Tel. (011) 222-8522



**DUWEST**  
Sociedad con DuPont

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	396-95	23-07-2002
BELICE		
EL SALVADOR		
HONDURAS	473, F.237, T.III	24-10-1997
NICARAGUA		
COSTA RICA		
PANAMA		
REP. DOMINICANA		