

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

ORIOUS 25 EW

FUNGICIDA - TRIAZOL
TEBUCONAZOLE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.04 g/ml a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO: MODO DE ACCIÓN:

Es un fungicida sistémico con acción curativa y protectante que inhibe la síntesis del ergosterol.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de usar **ORIOUS 25 EW**, calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que esta aplicando la dosis correcta. **ORIOUS 25 EW**, puede ser aplicado con boquillas de cono hueco y equipo de fumigación aéreo o terrestre.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa de **ORIOUS 25 EW**, que va a utilizar y mézclelo; posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza mezclas con **ORIOUS 25 EW**, con otros plaguicidas, haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la mezcla. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón o copa de medida de 25 cc. Para aplicaciones terrestres utilice 300-400 litros de agua por hectárea (210-280 litros de agua/mz). En aplicaciones aéreas utilice 20-30 litros de agua por hectárea (14-21 litros de agua/mz). Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación; báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.



RECOMENDACIONES DE USO:

Los siguientes cultivos listados son los aprobados para el uso de **ORIOUS 25 EW** en Guatemala.

CULTIVO	ENFERMEDAD	MOMENTO DE APLICACIÓN
Arroz <u>Oriza sativa</u>	Tizón de la hoja <u>Cochiobolus sativus</u> Añublo <u>Pycularia Oryzae</u> Escaldadura foliar <u>Rhynchosporium Oryzae</u>	Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad, máximo un 5% de infección, repetir la aplicación en caso de reinfección.
Banano <u>Musa spp.</u>	Sigatoka negra <u>Mycosphaerella fijiensis</u>	Realizar un máximo de 8 aplicaciones por año, en bloques de dos aplicaciones de productos con diferentes modo de acción.

DOSIS: La dosis recomendada son:

Arroz.....0.75-2.01 l/ha (0.5-1.4 l/mz)
Banano.....0.41 l/ha (l/mz)

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Se debe dar un plazo no menor de 35 días en arroz. En banano y plátano no existe restricción. Si va a mezcla con otro agroquímico ver en el panfleto la restricción del mismo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espera a que el rocío de la aplicación haya secado, o utilice el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

ORIOUS 25 EW, es compatible con la mayoría de los plaguicidas existentes en el mercado, se recomienda realizar una premezcla con agua con los productos a utilizar. No es compatible con productos alcalinos como caldo bordeles o sulfuro de lima.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte y no almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general.

Almacénese en un envase original, con su etiqueta y panfleto, en un lugar seguro, fuera de alcance de los niños y en un ambiente fresco y bien ventilado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Sedación, falta de coordinación, locomotriz, modo de andar espástico y dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Provoque el vómito dando de beber jarabe de ipecacuana, seguido de dos vasos de agua. En caso contrario de a beber dos vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos por espacio de 15 minutos con agua limpia.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico, seguir con tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-00-28632 2231-1548 y 2233-081 2231-6262
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	2232-2322 y 2232-2316
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2285-4700, Ext. 17 y 8755-0983
HONDURAS	Hospital Escuela	2223-1028
NICARAGUA	Centro de Intoxicaciones	523-4948
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	684-3478
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	681-2913
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos del producto deben enjuagarse tres veces, agregar el agua del enjuague a la mezcla; no permita que los envases sean utilizados para otros fines y propósitos. Destruya y queme el envase y entierrelo por lo menos 40 cm. de profundidad, alejado de fuentes de agua y casas de habitación. En caso de derrames, utilice un material absorbente como aserrín, recoja con una pala y entierrelo a una profundidad adecuada, alejado de fuentes de agua, casas de habitación y áreas de pastoreo.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y formulador garantizan que el contenido de este envase corresponde a la composición química especificada en la etiqueta. No se responsabiliza por el uso que de él se haga, así como de daños provocados directa o indirectamente de su uso y almacenamiento, lo cual estará a riesgo exclusivo del comprador quien asume toda la responsabilidad.

FABRICANTE Y FORMULADOR:

IMPORTADO POR:

MILENIA AGRO CIENCIAS, S. A.

Rua Pedro Antonio de Souza
400-86031-610-LONDRINA-PR-BRASIL
Teléfono: (55)-43-371-9000
FAX: (55)-43-371-9018

PAÍS

GUATEMALA

BELICE

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

REP. DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO

898-50

0277-2

AG.2001-11-635

258, F.129, T.II

MILE-190Q-2-2009

4369

1247

FECHA DE REGISTRO

19-12-2008

22-10-2009

29-11-2006

18-08-2004

30-11-2009

08-07-1999

25-11-2009