

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

PEGAMAX 9.71 L

ADHERENTE

ALCOHOL POLIVINÍLICO + ALQUIL ARIL POLIETER ALCOHOL + FORMALDEHÍDO

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.02 a 25°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

Por sus características agronómicas el producto es un adherente.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente solo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin fugas. Después de la aplicación lave meticulosamente el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

PEGAMAX 9.71 L debe aplicarse como último ingrediente al tanque de mezcla, después de haber preparado la mezcla según el plaguicida que se esté aplicando.



RECOMENDACIONES DE USO:

PEGAMAX 9.71 L es un agente tensoactivo, autoemulsionante, que posee propiedades dispersantes. Contiene un compuesto que lo hace un magnífico adherente para usarse en aspersiones agrícolas. Aumenta la permanencia del producto aplicado al follaje después de la lluvias. Por ser un aditivo para mezclar con plaguicidas, PEGAMAX 9.71 L, no protege plantas o cultivos contra plagas, y/o enfermedades, que es función del producto al cual se adiciona.

RECOMENDACIONES DE USO:

Las cantidades que se recomienda adicionar de PEGAMAX 9.71 L, son:

PRODUCTO	CANTIDAD DE PRODUCTO
Herbicidas	250-300 cc en 200 litros de caldo
Insecticidas y fungicidas	150-200 cc en 200 litros de caldo
Polvos humectables (fungicidas e insecticidas)	100-300 cc en 200 litros de caldo
Fungicidas y acaricidas líquidos	50-150 cc en 200 litros de caldo
Fertilizantes foliares	100-200 cc en 200 litros de caldo

Se recomienda utilizar PEGAMAX 9.71 L, principalmente en época lluviosa para evitar que los plaguicidas sean lavados de las hojas. El período entre la aplicación y la entrada de personas al área tratada depende del producto plaguicida (Mínimo 12 horas).

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Período entre la última aplicación y la cosecha es la que recomienda el fabricante del producto plaguicida.

INTERVALO DE REINGREO AL ÁREA TRATADA:

La misma que el plaguicida con que se esté usando PEGAMAX 9.71 L.

FITOTOXICIDAD:

No se ha determinado fitotoxicidad en ninguna plantación utilizando la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD:

PEGAMAX 9.71 L, es compatible con todos los plaguicidas que existen en el mercado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Debe mantenerse en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, manténgalo en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. Al transportarlo manténgalo alejado de productos alimenticios, animales, forraje y otros plaguicidas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO:

En condiciones de almacenamiento y en sus envases originales el producto es estable por un período de 2 años después de formulado.

Este producto debe transportarse y almacenarse bajo llave, fuera del alcance de los niños, personas incapaces y de animales, así como alejado de productos alimenticios, medicinas y herbicidas, en un lugar fresco y aireado. Mántengase en su envase original y con su respectiva etiqueta debidamente adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen en los humanos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua o clara de huevo. Busque ayuda médica. No provoque el vómito, si se produce espontáneamente, mantenga las vías respiratorias limpias.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco y aireado. Si es necesario suministre respiración artificial.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese las partes afectadas con suficiente agua.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese las partes afectadas con suficiente agua.

TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento médico es sintomático. De presentarse una intoxicación en una aplicación existe mucha probabilidad de que sea causada por el producto al cual se agregó el PEGAMAX 9.71 L que, en lo normal, puede ser más tóxico que éste.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT	(502) 2230-0807 y 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	(501) 223-1639
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262 y (503) 2231-9201
HONDURAS	Hospital Escuela Universitario	(504) 2232-2322 Ext. 420 y 478
NICARAGUA	Dirección de Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud	(505) 2289-4700, Ext. 1294
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2523-3600
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
REP. DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	(809) 681-7828, Ext. 2192

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS O ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Este producto aplicado sólo no daña el ambiente, pero los desechos y restos de mezclas con otros plaguicidas y envases utilizados, no deben contaminar fuentes de agua: ríos, lagos, pozos, etc. deben ser tratados y enterrados lejos de poblaciones a una profundidad no menor de 40 cm.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso, el fabricante no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

DISTRIBUIDO POR:



WESTRADE GUATEMALA, S.A.
15 Ave. 11-028 Zona 3, Colonia Monte Alegre
Tecn Umán, Ayutla, San Marcos, Guatemala C. A.
PBX: (502) 7932-0000, Fax: (502) 7932-0030



DUWEST
Sociedad con DuPont

DUWEST DOMINICANA S.A.
Km 7 Autopista Joaquín Balaguer, Parque
Industrial Santiago Norte (Pisano), Nave No.1
Santiago de Los Caballeros,
República Dominicana.
Tel.: (809) 241-9655, 575-3138,
Fax: (809) 576-6618

PAÍS

NÚMERO DE REGISTRO

FECHA DE REGISTRO

GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REP. DOMINICANA

3103

07-09-2008