

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

TALON® 72 SC

FUNGICIDA-BENZONITRILLO HALOGENADO
CHLOROTHALONIL

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,3333 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: TALON® 72 SC, es un FUNGICIDA protectante, que inhibe el proceso de germinación y desarrollo de los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila, equipo terrestre mecánico o avión. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar TALON® 72 SC, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando las dosis correctas. Se recomienda usar boquillas de cono hueco.

Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aplicación de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal al manipular TALON® 72 SC.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular TALON® 72 SC. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación del producto. De acuerdo con las dosis de TALON® 72 SC, a utilizar mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 a 40 libras por pulgada cuadrada, y un volumen de 20-50 litros de agua/ha (14-35 litros de agua/mz) para aplicaciones aéreas y 300 a 1000 litros de agua/ha (210-700 litros de agua/mz), para aplicaciones terrestres.



RECOMENDACIONES DE USO:

TALON® 72 SC, está recomendado en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Rep. Dominicana.

CULTIVO	ENFERMEDAD	
Banano y Plátano	Musa sp. Sigatoka negra Sigatoka amarilla	Mycosphaerella fijensis Mycosphaerella musicola
Café	Coffea arabica Mal del talluelo Mancha de hierro Ojo de gallo Mal de hilachas Phoma	Rhizoctonia solani Mycena citricolor Cercospora coffeicola Corticium koleroga Phoma costarricensis
Melón Pepino Ayote Zapallo, zucchini	Cucumis melo Cucumis sativus Cucurbita pepo Cucurbita maxima Antracnosis Mildíu Velloso Tizón de la hoja Mildíu polvoriento Tizón gomoso	Colletotrichum lagenarium Pseudoperonospora cubensis Alternaria cucumerina Sphaerotheca fuliginea Mycosphaerella melonis
Sandía	Citrus vulgaris Podredumbre del fruto	Rhizoctonia solani
Brocoli, coliflor, repollo, col bruselas	Brassica oleracea var. italica, botrytis, capitata gemmifera Mancha de la hoja Mildíu Velloso Mancha angular	Alternaria brassicae Peronospora parasitica Mycosphaerella brassicola
Ajo Cebolla	Allium sativum Allium cepa Mancha púrpura Moho gris	Alternaria porri Botrytis spp.
Apio	Apium graveolens Tizón temprano Tizón tardío Pudrición del tallo Pudrición rosada	Cercospora appi Septoria applicola Rhizoctonia spp. Sclerotinia sclerotiorum
Maní	Arachis hypogaea Mancha temprana de la hoja Mancha tardía de la hoja Roya	Cercospora arachidicola Cercosporidium personatum Puccinia arachidis
Papa	Solanum tuberosum Tizón temprano Tizón tardío	Alternaria solani Phytophthora infestans
Tomate	Lycopersicon esculentum Tizón temprano Tizón tardío Antracnosis Moho gris Pudrición del fruto	Alternaria solani Phytophthora infestans Colletotrichum phomoides Botrytis cinerea Rhizoctonia solani y Alternaria alternata
Zanahoria	Daucus carota Tizón temprano Tizón tardío	Cercospora carotae Alternaria dauci

DOSIS RECOMENDADAS:

Banano y plátano:	0,75-2,0 l/ha	(0,52-1,4 l/mz)
Café, ajo, cebolla:	15ml/m ² , 1,0-2,5 l/ha	(0,7-1,75 l/mz) ó 0,5-0,75 l/200 litros de agua.
Melón, pepino, ayote, zucchini, sandía, brocoli, coliflor, repollo, col de Bruselas, zanahoria:	1,75-2,25 l/ha	(1,23-1,58 l/mz) ó 0,5-0,75 l/200 litros de agua.
Maní, papa:	1,25-1,75 l/ha	(0,88-1,22 l/mz) ó 0,5-0,75 l/200 litros de agua.
Tomate:	1,5-2,25 l/ha	(1,05-1,58 l/mz) ó 0,5-0,75 l/200 litros de agua.
Apio:	1,2-1,7 l/ha	(0,84-1,2 l/mz) ó 0,5 l/200 litros de agua.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Banano y plátano: cada 8-21 días para sigatoka negra y 10-35 días para sigatoka amarilla.
Café: En semilleros aplicar al pie de las plantas 3 veces después del transplante cada 15 días. Para enfermedades foliares aplicar cada 28 días empezando al inicio de las lluvias.

Melón, pepino, ayote, zucchini, sandía: Aplicaciones al primer síntoma de la enfermedad y continuar cada 7 días por la temporada completa.

Brocoli, coliflor, repollo o col de bruselas: Iniciar las aplicaciones después del transplante o una vez germinadas las plantas en siembra directa. Repetir las aplicaciones cada 7-10 días por la temporada completa.

Ajo, cebolla y zanahoria: Inicie las aplicaciones con los primeros síntomas de la enfermedad, aplicar cada 7-10 días.

Maní: Iniciar las aplicaciones cuando se presente el primer síntoma de la enfermedad y continúe cada 14 días.

Tomate: Iniciar las aplicaciones con los primeros síntomas de enfermedad y aplicar cada 7 días.

Papa: Iniciar las aplicaciones al brotamiento de las plantas y continuar cada 7 días.

Apio: Aplicar cada 7 días después del transplante.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Cero días: banano, plátano, brocoli, coliflor, repollo, col de bruselas, melón, pepino, ayote, zucchini, sandía, papa, tomate, zanahoria.

Siete días: Apio.

Catorce días: Ajo, cebolla, maní.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Después que la mezcla del producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado.

FITOTOXICIDAD: Síntomas de fitotoxicidad pueden presentarse en hojas de algunas plantas de banano o plátano que hayan acumulado una cantidad razonable de aceite aplicado con fungicidas sistémicos. Sin embargo, ese daño es cosmético y superficial sin afectar la producción. Nunca se mezcle con aceite.

COMPATIBILIDAD: TALON® 72 SC, es compatible con plaguicidas cuya formulación es polvo mojable (WP), sin embargo, con los concentrados emulsionables y fertilizantes puede ser diferente, por lo tanto no es posible predecir el grado de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas; en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave. Al transportarlo hágalo alejado de productos alimenticios, animales, forrajes y otros plaguicidas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

TALON® 72 SC, puede causar irritación en los ojos y en la piel si cae diluido o puro. Puede causar reacciones alérgicas temporales, caracterizadas por el enrojecimiento de los ojos, irritación bronquial moderada y enrojecimiento de la piel expuesta. Si se ingiere en grandes cantidades, produce irritación del tracto gastrointestinal. No se conocen síntomas de intoxicación sistémica.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provoque el vómito, si se produce espontáneamente, mantenga las vías respiratorias limpias.

POR INHALACIÓN: Retire del área contaminada a la persona afectada y llévala a un lugar fresco, seco y ventilado; manténgala en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte a su médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Antídoto no tiene. El tratamiento debe ser sintomático. Las reacciones alérgicas temporales que produce se pueden tratar con cremas antihistamínicas, esteroides y/o esteroides sintéticos.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT	(502) 2230-0807 y 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	(501) 223-1639
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262 y (503) 2231-9201
HONDURAS	Hospital Escuela Universitario	(504) 2232-2322 Ext. 420 y 478
NICARAGUA	Dirección de Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud	(505) 2289-4700, Ext. 1294
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2523-3600
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
REP. DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	(809) 681-7828, Ext. 2192

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

ES TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben ser enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material. En caso de derrames, recójalos con aserrín o algún material absorbente y los envases perforados, en ambos casos entérrelos a 40 cm de profundidad, lejos de fuentes de agua superficiales o subterráneas y de casas de habitación.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de su aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso, el formulador no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FORMULADOR:

WESTRADE GUATEMALA, S.A.
15 Ave. 11-028 Zona 3, Colonia Monte Alegre
Tecún Umán, Ayulla, San Marcos, Guatemala, C. A.
Pécb: (502) 7932-0000, Fax: (502) 7932-0030

IMPORTADOR Y/O DISTRIBUIDOR:

DUWEST
Sociedad con DuPont

DUWEST GUATEMALA
2a. Avenida, 10-45, zona 9, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2321-4747, Fax: (502) 2321-4750

DUWEST EL SALVADOR
Calle el Progreso y Boulevard Venezuela, Frente al Seguro Social, en la Colonia Roma
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2521-1200, Fax: (503) 2223-8234

DUWEST HONDURAS
Boulevard del Norte, Río Blanco, contiguo a El Colonial, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2551-6948 al 49, Fax: (504) 2551-5098

DUWEST NICARAGUA
Km. 6,5 Carretera Norte, de las antiguas Of. de Siemens 230 m. al sur Contiguo al Hospital Alemán Nicaraguense, Ciudad de Managua, Nicaragua, C.A.
Tel.: (505) 2248-9030 y (505) 2240-1675

DUWEST COSTA RICA
Pavos, Zona Industrial a 100 mts. Oeste de las Oficinas de Pizza Hut, Edificio Tisa 3er. Piso San José, Costa Rica, C.A.
Tel.: (506) 2290-7850, Fax: (506) 2290-7115

CRUZ DEL SUR DUWEST PANAMÁ
Vía Interamericana frente a Durnan Esquirol, David, Chiriquí, Panamá
Tel: (507) 775-2968, Fax: (507) 774-0872

DUWEST REPÚBLICA DOMINICANA
Km. 7, Autopista Joaquín Balaguer, Parque Industrial Santiago Norte (Pisano), Nave No. 1 Santiago de Los Caballeros, República Dominicana.
Tel.: (809) 241-9855, 575-5138, Fax: (809) 576-6618

PAÍS
GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REP. DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO
396-167

FECHA DE REGISTRO
09-08-2005