

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



**CONSENTO® 45 SC**  
FUNGICIDA-CARBAMATE, IMIDAZOLE  
PROPAMOCARB-HYDROCHLORIDE, FENAMIDONE

**ATENCIÓN**  
ANTÍDOTO: NO TIENE  
DENSIDAD: 1,12 g/mL a 20° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Fungicida de uso agrícola

**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:** Debido a sus ingredientes activos, **Consenito 45 SC** combina dos modos de acción, el traslaminar y el sistémico, y con sus distintos mecanismos de acción: Fenamidone inhibe la respiración mitocondrial y Propamocarb HCL es un fungicida que afecta la síntesis de los fosfolípidos, ácidos grasos y por ende afecta la membrana del hongo. **Consenito 45 SC** actúa a nivel preventivo y curativo. Se transloca vía xilema. Para manejo de resistencia según clasificación FRAC pertenece al grupo 28/11.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** **Consenito 45 SC** se aplica vía terrestre con equipo de aspersión manual de espalda o motorizado. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentra en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta. Para aplicar este producto se recomienda utilizar boquillas de cono.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Agítese bien antes de utilizar el producto. Vierta la mitad de agua y agregue la dosis recomendada de **Consenito 45 SC**, agite la mezcla. Mantenga el agitador funcionando durante las operaciones de llenar, mezclar y rociar. Asegúrese de contar con el equipo

necesario para dosificar, mezclar y aplicar el producto. Agítese bien antes de utilizar el producto. Para un óptimo desempeño del producto el pH del agua debe oscilar entre 5 y 7. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo.



**RECOMENDACIONES DE USO:**

Volumen de agua 200 a 400 L/ha (140 - 280 L/mz).

Usos autorizados para Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Cuba:

CULTIVOS	ENFERMEDADES
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Mancha foliar gris <i>Septoria lycopersici</i>
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mildiu vellosa <i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Calabazas <i>Cucurbita</i> spp.	<i>Cladosporium cucumerinum</i> Moho felpuído <i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Ojo de sapo <i>Cercospora nicotianae</i> Moho azul <i>Peronospora tabacina</i> Pata negra <i>Phytophthora palmivora</i>
Repollo <i>Brassica oleracea var capitata</i>	Alternaria <i>Alternaria brassicae</i> Moho felpuído <i>Peronospora brassicae</i>
Hule <i>Hevea brasiliensis</i>	Raya negra <i>Phytophthora palmivora</i>
Uva <i>Vitis vinifera</i>	Mancha negra <i>Gulgnardia bidwellii</i> Moho felpuído <i>Plasmopara viticola</i>
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Moho felpuído <i>Peronospora destructor</i>
Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	Moho felpuído <i>Bremia lactucae</i>
Naranja <i>Citrus sinensis</i> Limón <i>Citrus limon</i> Mandarina <i>Citrus reticulata</i>	Gomosis de los cítricos: <i>Phytophthora parasitica</i> <i>Phytophthora citrophthora</i>
Chile <i>Capsicum annuum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria alternata</i> Tizón tardío <i>Phytophthora capsici</i>
Ornamentales	Moho felpuído <i>Peronospora</i> sp.

**DOSIS RECOMENDADAS:**

**HULE:** 60 mL de **Consenito 45 SC** por galón de agua directamente sobre el panel de pica con una brocha de 2 pulgadas.

**RESTO DE CULTIVOS:** 2 a 2,25 L/ha (1,25 a 1,50 L/mz)

**OBSERVACIONES:**

**NARANJA, LIMÓN Y MANDARINA:** En drench húmero durante la producción de plantas jóvenes y en el campo. Aplicar cerca de las raíces.

**ORNAMENTALES:** Antes de hacer tratamientos general, hacer pruebas previas.

Usos autorizados en Nicaragua:

CULTIVO	ENFERMEDAD	ÉPOCA	DOSIS
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	Etapa vegetativa	2,14-2,85 L/ha (1,5-2 L/mz)

**Usos autorizados en Costa Rica:**

CULTIVO	ENFERMEDAD	ÉPOCA	DOSIS
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	Etapa vegetativa	1,5-2,0 L/ha (1-1,4 L/mz)
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	Mildiu vellosa <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Etapa vegetativa	2,0 L/ha (1,4 L/mz)

**INTERVALO DE APLICACIÓN:**

Para el cultivo de hule realizar hasta un máximo de 8 aplicaciones por año.

Resto de cultivos realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar aplicaciones con intervalos de 5-10 días.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** 7 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:** **Consenito 45 SC**, no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:**

**Consenito 45 SC**, es compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo, antes de hacer la mezcla, realice previamente pruebas para comprobar compatibilidad. No se recomiendan mezclas con reguladores de crecimiento, con cobre o con fertilizantes foliares que contengan alta concentración de nitrógeno.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Utilice el equipo de protección personal recomendado consistente en: botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, guantes. Inutilice los envases vacíos, perforélos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cubralos con aserrín u otro material orgánico absorbente y luego elimínelo según la legislación y normas locales vigentes.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Conserve y transporte el **Consenito 45 SC** en su envase original bien etiquetado y cerrado herméticamente. No lo transporte junto a herbicidas, forrajes, alimentos y medicamentos. Almacénelo en lugar fresco y seco. Manéjese con cuidado para evitar derrames.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



**NO COMER, FUMAR O BEBER, DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**

**BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Irritación dermal, ocular y de la membrana mucosa y gastrointestinal. Pueden presentarse también síntomas como dolor de cabeza, sudor excesivo, náuseas, vómitos y dificultad en la respiración.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Aplique tratamiento sintomático.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN**

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONOS
Centro de Información y Asesoría Toxicológica	GUATEMALA	(502) 2251-3560
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-6262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 232 2322
		(504) 232 2316
Depto. de Toxicología / MINSA	NICARAGUA	(505) 2289-4700 ext. 1294
		(505) 8755-0983
Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 22231028 / 800 INTOXICA
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	PANAMA	(507) 5234948
Hospital Dr. Moscoso Puello	REP. DOMINICANA	(809) 681-7828
Karl Heusner Memorial Hospital	BELICE	(501) 223-0778
Hosp. Militar Carlos Finlay	CUBA	(537) 2601230
		(537) 2608751
Villa Clara		(042) 22-6197 / 22-4770
Ciego de Avila		(033) 48-1572 / 48-1575
Santiago de Cuba		(022) 64-1000 / 64-3864

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, úbralos con aserrín u otro material orgánico absorbente y luego elimínelo según la legislación y normas locales vigentes. Este producto no es inflamable ni corrosivo. Propomcarb Hydrochloride no es persistente en suelo ni agua. Fenamidone no es persistente en suelo y es ligeramente persistente en agua.

**RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Lavar el equipo al terminar la aplicación: cubetas, paletas de agitación y cepillo. Este equipo debe estar bien marcado y no debe emplearse para otros usos. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo. Inutilice los envases vacíos, perforelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo si no se cumplen con las recomendaciones suministradas por el registrante. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo.

**EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS DE CARENANCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN DEL PAÍS DE PRODUCCIÓN. EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN ES DE PLENA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONOCER LOS LÍMITES DE TOLERANCIA DE SU MERCADO DE DESTINO, SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE EN CUANTO A LA DECISIÓN DE EXPORTACIÓN.**

**FORMULADO POR:**

**Bayer S.A.**

km 29.5 Ruta al Pacífico

Amatitlán, Guatemala

Tels. 6628-7200 / 6628-7211

qhse-bcs.centroamericaycaribe@bayer.com

**IMPORTADOR:**

**Bayer, S.A.**

km 29.5 Ruta al Pacífico

Amatitlán, Guatemala

Tel.: (502) 6628-7200 / 6628-7211

**Bayer, S.A. de C.V.**

Noveno piso, Torre Corporativa Novacentro

Parque Comercial Los Próceres

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: (504) 2269-2100

**Bayer, S.A.**

km 11.5 Carretera a Masaya

Managua, Nicaragua

Tel.: (505) 2798311

**Bayer, S.A.**

Ocicoentro Plaza Tempo, Edificio A (2do Piso)

Autopista Próspero Fernández,

contiguo al Hospital CIMA Escasú

San José, Costa Rica.

Tel.: (506) 2505-6300 / 4100-6300

Fax: (506) 2505-6305 / 4100-6305

**Bayer Panamá, S.A.**

Complejo Global Business Terminal

Avenida Domingo Díaz

Torre A, 5to piso

El Dorado, Panamá

Tel: (507) 271-6100

Fax: (507) 271-6106

**Bayer, S. A.**  
Avenida Luperón  
Zona Industrial de Herrera  
Sto. Domingo, Rep. Dom.  
Tel.:(1-809) 530-8086

**Bayer Handelsgesellschaft GmbH**  
Calle 3ra e/ 76 y 78, Edif. Beijing,  
Piso 1, Oficina 101  
Centro de Negocios Miramar,  
Playa, La Habana, Cuba  
Tel.: (537) 204-1383  
Fax: (537) 272-4552

**EL Salvador**  
**AGROQUÍMICA INTERNACIONAL S.A de CV**  
Km 31 Carretera A San Juan Opico,  
Sitio del Niño, La Libertad El Salvador  
Tel.: (503) 2367-7315 / 2319 4141

**COMERCIAL AGROPECUARIA S.A de CV**  
67AV, Sur #142 Colonia Escalón San Salvador  
Tel. (503) 2510-8400  
ventas@coagro.com

**BUGSTING S.A. de CV (AGRIHUNTING)**  
Carretera Panamericana desvío el Poliedro,  
Lourdes Colón, La Libertad  
Tel.: (503) 2283 9375 / 2256 5109

**TÉCNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA (Tecun)**  
KM 9.5 Carretera al Puerto de La Libertad  
frente al V.M.T. Antiguo Cuscatlán,  
Departamento de La Libertad.  
Tel.: (503) 2121 2000

**Honduras**  
**DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R. L.**  
Complejo de Bodegas Mandofér, frente a Residencial  
El Molino, Tegucigalpa, Honduras  
Tel.: (504) 2221-0857 / 2221-0857  
jjaar@delcampo.hn

**AGRINTER HONDURAS S.A. DE C.V.**  
Boulevard del Este, Carretera al Polvorín 400 mts antes  
de empalmar a carretera salida a La Lima, complejo de  
Bodegas Metalco, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.  
Tel.: (504) 2553-8498  
raviles@agrinter.com.sv

**COOPERATIVA CAFETALERA**  
**SIGUATEPEQUE LIMITADA "COHORSIL"**  
Barrio arriba, 4ta avenida 1era calle Nor-este,  
Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tel.: (504) 2773-0385 / 2773-4612  
martinez@cohorsil.hn

**NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS /**  
**AGROCOMERCIAL GAITAN**  
Calle Circunvalación, Colonia Palmera del Valle salida a  
Tegucigalpa, una cuadra al sur de supermercados  
La Colonia, Danlí, El Paraiso, Honduras.  
Tel.: (504) 2793 6354 / 2763 4266 / 2793 6354  
nsanchez83@hotmail.com

**EI COLONO AGROPECUARIO S.A. DE C.V.**  
Colonia Colombia, 6 Ave. entre 16 y 17 calle, Boulevard del Norte,  
contiguo a Wendy's, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.  
Tel.: (504) 2557 2889 / 2557 2889  
alopez@colonoagropecuario.hn

**AGROPECUARIA MONTELIBANO, S.A. DE C.V.**  
Dirección #1: Finca Santa Rosa, Carretera que de San Lorenzo  
conduce a Coyolito KM12, Comunidad de el Chircal, San Lorenzo,  
Valle, Honduras, Tel. +504-2780-9351 ó 52  
Dirección #2: Finca Montelibano, Carretera de Choluteca a  
Guasale Km 17, Comunidad de San Geronimo, Namasigüe,  
Choluteca, Honduras.  
Tel.: (504) 2780-9351 / 2780-9352  
miguelmolina@agrolibano.com

**Nicaragua**  
**DISTRIBUCIONES AGROALFA S.A.**  
Km 130 Carretera Managua Chinandega, Rotonda Chinandega 400  
metros al Oeste, Chinandega, Nicaragua.  
Tel.: (505) 2266-0188  
agroalfa@agroalfa.com.ni

**EL COLONO AGROPECUARIO, S.A**  
Carretera Norte, Km 4.5, Logixplaza  
(Antiguas Instalaciones de Grupo Q)  
Bodega #14  
Tel.: (505) 5868-6254  
aquantanilla@colonoagropecuario.com.ni

**SAGSA DISAGRO**  
Paso a Desnivel Portezuelo 300 mts al Norte, Apto. No. 2657,  
Managua, Nicaragua  
Tel.: (505) 2249-1640  
yrocha@disagro.com

**MERCADEO Y AGROPECUARIA BONAFIDE**  
Bodega 1: Km 105 Carretera Panamericana Bodegas Azules,  
Sébaco, Matagalpa, Nicaragua.  
Bodega 2: PUMA Nindirí, 330 mts Sur Oeste,  
Nindirí, Masaya, Nicaragua.  
Tel.: (505) 2528-1823  
agrobonafide@abofisa.com.ni

**República Dominicana**  
**BIOAGRO**  
Avenida Isabel Aguiar No.148B, Zona Industrial Herrera, Santo  
Domingo Oeste, República Dominicana  
Tel.: (1-809) 530-2400  
juan.vargas@bioagro-int.com

**AGRODETALLE**  
Isabel Aguiar 150 Zona Herrera, Santo Domingo Oeste,  
República Dominicana  
Tel.: (1-809) 537-4446  
pgonzalez@agrodetales.com

**JUAN JIMENEZ**  
Avenida Duverge No.1 Constanza La Vega,  
República Dominicana  
Tel.: (1-809) 539-2329  
vegetales66@hotmail.com

**FERQUIDO**  
Avenida Luperon Esquina Central,  
Santo Domingo Oeste, República Dominicana  
Tel.: (1-809) 530-5598  
shirley.fat@empresasnagri.com

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO
GUATEMALA	
HONDURAS	356-184-II
PANAMÁ	1973ab
R. DOMINICANA	2658
NICARAGUA	BY-001B-2-2011
COSTA RICA	870256