

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Lannate® 21,6 SL

INSECTICIDA - CARBAMATO
METHOMYL



TÓXICO

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA
DENSIDAD: 0.97 g/ml a 20° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

LANNATE® 21,6 SL, es un insecticida sistémico de contacto y estomacal, ovidica, larvicida y adulticida.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

LANNATE® 21,6 SL, puede aplicarse con equipos de aspersión terrestres y aéreos. En ambos casos el personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Se recomienda el uso de boquillas para aplicación de insecticidas.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se diluye en agua antes de aplicarlo. Llene la mitad del tanque de mezcla con agua, inicie agitación y vierta la cantidad requerida de producto, continúe agitando y termine de llenar el tanque con agua. Se necesita de agitación constante. Mantenga siempre a mano el equipo auxiliar que consiste en cubetas, dosificadores, paletas, brochas, cepillos y otros que le sean de utilidad en la preparación y aplicación del producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

LANNATE® 21,6 SL, esta recomendado para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Rep. Dominicana.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA
Algodón <i>Gossypium hirsutum</i>	Complejo de bellateros <i>Heliothis zea</i> , <i>Heliothis virescens</i> , <i>Prodenia eridania</i> , <i>Prodenia latisfascia</i> Falso medidor <i>Spodoptera exigua</i>	1,2 - 2,5 l/ha 0,85 - 1,75 l/mz	5 - 7 días
Pepino <i>Cucumis sativus</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i>	Gusano medidor <i>Trichoplusia ni</i> Gusano barrenador <i>Diaphania spp.</i> Gusano cortador <i>Prodenia spp.</i> Pulgá saltona <i>Epirixia spp.</i>	1,2 - 2,5 l/ha 0,85 - 1,75 l/mz	3 días
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Tortugillas <i>Diabrotica spp.</i>		
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Gusano medidor <i>Mocis spp.</i> Chicharrilla <i>Sogatodes oryzicola</i>	1,2 - 2,5 l/ha 0,85 - 1,75 l/mz	7 días
Repollo <i>Brassica oleracea</i> var <i>capitata</i> Brocoli <i>Brassica oleracea</i> var <i>italica</i> Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var <i>botrytis</i>	Gusano de la col <i>Pieris rapae</i> Palomilla de la col <i>Plutella xylostella</i> Gusano cortador <i>Prodenia spp.</i>	1,2 - 2,5 l/ha 0,85 - 1,75 l/mz	3 días
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Soya <i>Glycine max</i>	Chicharrilla <i>Empoasca spp.</i> Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	1,2 - 2,5 l/ha 0,85 - 1,75 l/mz	7 - 14 días
Maíz <i>Zea mays</i> Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Gusano elotero <i>Heliothis zea</i> Gusano medidor <i>Mocis spp.</i> Mosquita del sorgo <i>Contarinia sorghicola</i>	1,2 - 2,5 l/ha 0,85 - 1,75 l/mz	10 días
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Palomilla <i>Phthorimaea operculella</i> Gusano medidor <i>Trichoplusia ni</i> Gusano cortador <i>Peridroma spp.</i> Pulgá saltona <i>Epirixia spp.</i> Afidés <i>Myzus spp.</i>	1,2 - 3,0 l/ha 0,85 - 2,0 l/mz	6 días
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Gusano del fruto <i>Heliothis spp.</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i> Minador de la hoja <i>Lyriomyza spp.</i> Gusano alfiler <i>Keliferia spp.</i> Afidés <i>Myzus spp.</i>	1,2 - 2,5 l/ha 0,85 - 1,75 l/mz	1 día
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Gusano comudo <i>Manduca sexta</i> Gusano de la yema <i>Heliothis virescens</i> Gusano medidor <i>Trichoplusia ni</i> Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Gusano cortador <i>Peridroma spp.</i>	1,2 - 2,5 l/ha 0,85 - 1,75 l/mz	5 - 14 días

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Debe ser de 5 a 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Esperar 24 horas antes de ingresar a las áreas tratadas con este producto.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Dependiendo del cultivo a tratar. Véase tabla de intervalos según cultivo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas actualmente en uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

POR ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

LANNATE® 21,6 SL, debe conservarse en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado. Almacénelo en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. Transportelo y almacénelo alejado de productos alimenticios, animales, forraje y otros plaguicidas. La vida útil del producto puede verse disminuida si se almacena en condiciones de humedad excesiva.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.



BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambre abdominal, constricción de las pupilas, sudoración, pulso lento y temblor muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese la parte afectada con agua y jabón.

POR INHALACIÓN: Retire del área contaminada a la persona afectada y llévela a un lugar ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua limpia durante 15 minutos como mínimo.

¡NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El antídoto específico es sulfato de atropina, inyectado en forma intravenosa. Si es necesario dar respiración artificial.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TÉLFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT	(502) 2230-0735 y 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	(501) 223-1548 y 223-5686
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262 y 2231-9201
HONDURAS	Hospital Escuela Universitario	(504) 2232-2322, Ext. 494, 420 y 478
NICARAGUA	Dirección de Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud	(505) 2289-4700, Ext. 1294 y 8755-0983
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4946 y 523-4948
REP. DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	(809) 681-7828, Ext. 2192

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA EL GANADO.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



TÓXICO PARA ABEJAS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" luego destruirse y enterrarlos a una profundidad no menor de 40 cm lejos de fuentes de agua y casas de habitación. Desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, deben ser eliminados en lugares lejanos, de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, el formulador no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FORMULADOR:



WESTRADE GUATEMALA, S.A.
15 Ave. 11-028 Zona 3, Colonia Monte Alegre
Tecnión Uvén, Ayutla, San Marcos, Guatemala C. A.
P.BX: (502) 7932-0000

IMPORTADO POR:



DUWEST

DUWEST GUATEMALA
2a. Avenida, 10-45, zona 9, Ciudad de Guatemala, Guatemala C.A.
Tel.: (502) 2321-4747

DUWEST EL SALVADOR
Calle Simens No. 56 Zona Industrial Santa Elena Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.
Tel.: (503) 2521-1200

DUWEST HONDURAS
Boulevard del Norte, Río Blanco, Contiguo a El Colonial, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2551-5948 al 49

DUWEST NICARAGUA
Km. 6.5 Carretera Norte, de las antiguas Of. de Siemens 200 mt. al sur Contiguo al Hospital Alemán Nicaragüense, Ciudad de Managua, Nicaragua, C.A.
Tels.: (505) 2248-9030 y (505) 2240-1675

DUWEST CAFESA COSTA RICA
San José, La Uruca, 600 metros noreste de la Rotonda Juan Pablo II. San José, Costa Rica, C.A.
Tel.: (506) 2232-2255

DUWEST CRUZ DEL SUR PANAMÁ
Via Interamericana frente a Durman Esquivel, David, Chiriquí, Panamá
Tel.: (507) 775-2968

DUWEST DOMINICANA
Nave No. 1, Local C, Zona Industrial, Santiago-Norte (Pisano), Aut. Joaquín Balaguer, Km 5 Santiago Navarrete, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
Tels.: (809) 241-9655, 575-3138

PAÍS
GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REP. DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO
396-94
0115-3

FECHA DE REGISTRO
30-07-1997
24-11-2000