

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



WESTRADE

ARQUERO 10 SL

FUNGICIDA – TRIAZOL
CYPROCONAZOLE

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.12 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

Fungicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Fungicida del grupo de los triazoles sistémico y de contacto con actividad preventiva, curativa y erradicante. En las plagas, cyproconazole inhibe la biosíntesis del esteroles, el cual es un componente esencial de la membrana de la pared celular de los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplicación foliar con bomba de espalda manual, a un presión constante de 45 psi con una boquilla cónica TX-12 para aplicar fungicidas, con un volumen de 300 litros de agua/ha. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo utilizando agua. El equipo y los utensilios usados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un agujero, lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule.



FORMAS DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

El personal que manipule el producto debe utilizar equipo de protección. Llenar el tanque de aspersión con agua limpia, agregar la cantidad recomendada de producto y agite para que se mezcle homogéneamente con el agua. El pH del agua debe estar entre 5.5 a 6.5.



RECOMENDACIONES DE USO:

El producto **ARQUERO 10 SL** está recomendado para uso en Guatemala y Honduras.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya del Café <i>(Hemileia vastatrix)</i>	200 – 400 mL/ha 140 – 280 mL/mz	Utilizar un volumen de 300 litros de agua. Iniciar aplicaciones a principios de la estación lluviosa, a inicios de la curva de progreso de la enfermedad y cuando la incidencia de la infección de pústulas activas de roya está alrededor del 5% (generalmente a los 90 días después de la floración principal). Una segunda aplicación puede ser necesaria a los 30 - 45 días después de la primera y de acuerdo a los resultados del monitoreo de la enfermedad.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

30 - 45 días. El número de aplicaciones de **ARQUERO 10 SL** por ciclo de cultivo varía entre 2 y 3, según la presión de la enfermedad y la intensidad de las lluvias.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

ARQUERO 10 SL, no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto debe almacenarse y transportarse alejado de alimentos, ropa, forraje u otros plaguicidas y fertilizantes. Mantenga el producto solamente en su envase original en un lugar inaccesible para niños y mascotas. Almacene en un lugar fresco y seco. No almacene en o cerca de casas habitación.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN. GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede ser dañino si se inhala. Puede causar irritación en ojos, piel y garganta.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT
HONDURAS	Hospital Escuela Universitario

TELÉFONO
(502) 2230-0735 y 1-801-00-29832
(504) 2232-2322, Ext. 494, 420 y 478

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Este producto no es persistente en el suelo y agua. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las regulaciones locales. Recoja lo derramado con un material absorbente como aserrín


RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUSES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUETEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y DESECHOS REMANENTES:

Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos o trítúrelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las regulaciones locales. Recoja lo derramado con un material absorbente como aserrín o arena.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador y registrante garantizan que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición físico químicas del producto y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Este producto se vende en el entendido de que el comprador asume todos los riesgos del uso, manejo, almacenaje y disposición del producto que estén fuera del control del vendedor y, que puedan resultar en pérdidas o daños al comprador o a cualquier tercero en sus personas o bienes.

FORMULADO POR:

WESTRADE GUATEMALA, S.A.
15 Ave. 11-028 Zona 3, Colonia Monte Alegre
Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, Guatemala C.A.
PBX: (502) 7932-0000
Correo electrónico: servicioalcliente@duwest.com

PAÍS
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS

NÚMERO DE REGISTRO
381-166
897, F.726, T.II